

太醫院經驗奇效良方大全

太醫院經驗奇效良方卷之五十二

脫肛門 附論

脫肛之證難經云虛實出焉出者為虛入者為實肛門之脫非虛無故然哉蓋實則溫溫則內氣充有所蓄虛則寒上則內氣發而不能收況大腸有羣薄與肺為表裏肺虛蘊熱則閉虛則脫三因之論且婦人有此疾者產育用力過多小兒此疾皆因久利大腸虛冷所為也肛門為大腸之候大腸傷於寒利而用力努軀其氣下衝肛門脫出也用香附子荊芥等分煎湯洗之或以五倍子碾為細末放於紙上托入肛緩緩揉入若或長久男子變成腸風痔漏腸出不收至於出數寸者以五倍子朴硝等分煎湯洗之亦用木賊燒灰不令烟盡入麝香少許大便秘貼少許効又有久痢臟虛皆能令入肛門突出有腸頭作痒即腹中有虫丈夫由此酒色過度大腸者傳道之官腎者作強之

官蓋腎虛而洩母氣因肺虛是以大腸氣無所主故自肛脫治法實原氣去蘊熱之劑外用煎藥洗之醫治无不愈矣

脫肛通治方

蝟皮散

治肛門脫出不收

蝟皮

一箇燒兩燒令焦黃存性

磁石

半兩火煨於瓶內燒碎七次

辣桂三錢

鼈頭

一枚炙令焦黃

右為細末每服三錢食前米飲調下用鞋底炙熱熨按肛

上托入

文蛤散

治大腸虛寒肛門脫出不收或用力太過及小兒叫

呼久痢后皆脫肛

文蛤

即五倍子不拘多少

右為細末水煎汁浸洗更入白礬蛇床尤佳洗後用赤石脂為末少許搽在芭蕉葉上頻用托入或脫出有長尺許

者以兩礬相並中空一尺以磁瓶盛藥水滿與礬相平令病人仰卧所脫浸在瓶中逐日換藥水如此浸經為度

槐花散 治脫肛

槐花 槐角各等分 炒香黃

右為細末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下

縮砂湯 治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

縮砂 黃連 木賊各等分

右為細末每服二錢空心用米飲調下

乳香丸 治脫肛腸出

乳香另研 白丁香各二錢半 枳殼去穢炒 芫青去頭足

大黃蒸焙 鶴虱草炒 萆澄茄 牡蠣煅各半兩

右為細末粟米糊為丸如梧桐子大每服三十丸腸風膿茶清送下諸痔煎薤白湯送下諸漏鐵屑煎湯下空心服

礞石散

治脫肛

礞石半兩火煨

右為細末每服一錢空心米湯調下

香荊散

治脫肛

香附子

荊芥穗各半縮砂二錢

右為細末每服三錢食前用白湯調下

治腸頭挺出

右用蝦蟆皮一片燒付患處一方瓶內燒熏

治脫肛歷年不愈

右用生鐵五斤水一斗煮取五升出鐵以汁洗日再無不瘥并燒礞石粉之則亦良

木賊散

治脫肛不熱

右用木賊燒存性為末搽肛門上按之

螻蛄丸 治肛門癢或出膿血有虫傍生孔竅內

螻蛄七粒五月五日收 新牛糞半兩 肥羊肉一兩

右共如膏丸如蓮子大炙令熟以新綿薄裹內下部中半日少喫飯即大便中虫出三五度永瘥

治穀道蟹赤腫又痒方

右用杏仁搗作膏傅之一方熬令黃搗以綿蘸塗穀道中

治肛門腫痛

右用木櫛子去殼取肉四五枚研如泥安新瓦器或木盆以沸湯衝動洗了另用少許塗患處

太醫院經驗奇効良方卷之五十二

太醫院經驗奇效良方卷之五十三

瘍風門 附論

內經云風氣與太陽行諸脉俞散於肌肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉腫脹而有瘍衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也瘍者有榮衛熱附其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚瘍潰風寒客於脉而不去名曰瘍風以其酷熱暴悍可畏耳夫人患此病者先分在上在下所感之處古方治以在上者以醉仙散取其臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳虫於穀道中出然此邪毒藥雖攻出其源尚在經絡受病於陽明一經凡治此病先觀患人身上疣瘡與瘡若先見於上者或下體多者或上下同得者或下而復在上者乃陽明胃經也是以無物不受此其濕熱浸漬經絡久則虛使風入於人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受甚重非醫之神

手能起此病者鮮矣有或從上或從下以漸而來者皆是可治之病人見其病勢緩多忽之若能攝養保和得宜鮮有不愈者也若不能絕滋味遠色慾皆不免再發則終於不能救矣前人曾治五人中間惟一婦人得免而疾安以其貧甚無物可喫欲啖無從所覓餘四人不能禁忌妄作者三二年後皆再發而危孫真人云吾常治四五百人終無一人免於死非孫真人不能治也蓋無一人能守禁忌耳此一婦人本病外因又服三五百貼加減四物湯半年之上方得月經行十分安愈若人患此鼻柱壞爛肌肉癆潰者是知陽明經分受風木之邪也明矣不可泥於風寒而已內有臭涎惡血陳虫惡物之類者又何為而致然也蓋謂厥陰主生五虫其相火熱甚而制金金衰故木來侮肺受熱而氣不清矣况血隨氣運涎隨氣降氣既不能施化則血聚而涎積矣血聚久則所惡涎積久則臭濁濕涎熱血相為

熏蒸久則肌肉潰爛而生虫治之使邪出於腸繞大腸之間者
乃是陽明經之道路也蓋其土敗木賊之證宜乎況又不能守
戒忌者欤此卅溪先生所以痛言之深也大風病是受天地間
殺物之風右為厲風可不畏哉三因方之所載此其惡疾者是
也雖名曰風未必因風所得大抵多嗜色慾勞動氣血熱發汗
泄不避邪風冷濕使淫氣與衛氣相干致肌肉皮膚腐潰鼻梁
塌壞千金方云所謂自作不仁極猥之業雖有悔言而無悔心
灸可瘳也然亦有傳染者原其所因皆夫婦不知禁忌因而不
避風寒暑濕之氣因虛邪入經絡久則漸成斯疾又有勞役飲
食涎結於胃流入經絡風涎相搏致使風痺不可一例作厲風
治之則誤矣內經云脉風成為厲俗云癩病也先禪皮散從少
至多服三五七日灸承漿穴七壯灸瘡輕再灸瘡愈三灸之後
服二聖散泄熱祛血中之風邪戒房室三年病愈藥灸同止述

類右形此治肺風之法也靈樞云腐風數刺其腫上已刺以銳針其處按出其惡氣腫盡乃止常食方食勿食他食以犯其病且癰病古今以為難治之證前八救生民之病苦置諸方論詳備于象後之學者誠心鑒諸

癰風通治方

通天再造散 治大風惡疾

欬金

半一兩

大黃

一兩

白牽牛

取頭末六分半生半炒

皂角刺

一兩炮

右為細末每服五錢日末出而東以無灰酒調下盡量為度晚利黑頭小虫病稍輕者止利如魚腸臭穢物忌食發毒之物半年但食稠粥軟飯漸止調理自然頭尾皮膚如常甚者不過三兩次須將理不可妄有勞動及終身不得食牛馬驢騾等肉犯者死不可救矣

神効追命散 治大風

北大黃牝子 川礬金半兩 大皂莢刺一兩

右為細末每服二錢用真大楓子油入好酒溫調臨睡服
隔兩日再服宜候瀉下無虫方瘥

皂棘湯 治大風

皂莢刺斤半主半 北大黃一斤 輕粉半斤

右為細末每服二錢空心酒調服取下惡物服藥數日齒
出毒血甚臭

皂角丸 治大風諸癩

肥長皂角二十條先炙透後去皮弦其核自落

右以皂角肉多用酒慢火煎得稠粘瀝去清者候冷入雪
糕拌為丸如梧桐子大每服五十丸不問飢飽酒送下

硫黃酒 殺癩風虫

方五十三

右酒調空心飲清汁明日添硫黃再研入酒如前服或添

大楓子油更好

治大風諸癩惡虫內蝕形骸變壞

天靈蓋 三兩 蝦蟆 二箇 去足 桃仁 去皮

人中白 二兩 麝香 一兩 雄黃 硫黃 各一

穿山甲 燒灰 老皂莢刺 燒存性 輕粉 二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九丸月初五更

米飲湯送下連日取虫盡則愈殺瘰癧虫通用

烏蛇丸 治風癩殺虫

烏蛇肉 酒浸 蜂房 炙各一 桃仁 浸去皮 白蒺藜 去刺

皂角刺 炒焦 貫仲 獨活 槲柳

苦參 各半 蕪荑 雷丸 雄黃

硫黃各半

硃砂二錢

胡麻子四兩

蝦蟆二箇去頭足炙焦

右為細末以長皂角十條水三升煎成膏和藥末丸如梧
桐子大每服三十丸空心溫酒送下

治大風

右用烏蛇三條葦治令淨熬熟去骨取肉焙乾為細末
用宿蒸餅丸如米粒大以喂烏雞其雞食盡烏蛇三條後
却烹雞取肉為末或為丸或作散酒服之丸時仍用宿蒸
餅每服三五丸甚者不過三五雞即愈

雷丸散 風癩取土

雷丸

阿魏

實叢木

各二錢 麝香 半分

水銀

硫黃

雄黃

各二錢 半斤乳 碎入 同 張令 盡 為 度

右為極細末每服一錢天明溫酒調下明日再服

蝦蟆丸 治大風殺五虫

乾蝦蟆一兩肥長皂角一條先炙香後去

右為細末以竹管引入羊腸內繫兩頭用麩二升鋪饒內

置麩上蒸熟去麩入麝香半錢同搗丸如梧梧子大每服

二十一丸空心溫酒送下

蔓荊丸 治大風

蔓荊子 蒼耳子 枸杞子 牛蒡子炒

黑牽牛炒 胡麻子 香白芷 何首烏

威靈仙 荊芥穗 白蒺藜炒去刺 直僵蠃炒去

細辛 皂角刺 苦參 大草烏去皮尖生用

獨活各一兩

右為細末大風油和丸如梧桐子大每服二十四丸食前

用茶清送下

胡麻散 解風熱毒氣癰疹瘰癧

方見風門

行効第一方 治癰風即大風惡疾癰是也雖名曰風未必皆因風大率多嗜慾勞動氣血熱發汗出不避邪風使淫氣相干則肌肉不仁勞氣泣濁則肘腋不利故色敗皮膚癢潰鼻梁塌壞或自作不仁極猥之業所致久則或遍身白皮脫落如蛇蛻狀

右用桑枝灰一斗熱湯淋取汁洗頭面次用大豆及菴豆漿添熱水三日一浴一日一洗面却用側柏葉蒸曝乾白膠香各等分爲細末滴水爲丸不拘時溫水下三七粒日三服

仙方

治大風惡疾雙眼昏咫尺不辨人物髮眉自落鼻梁崩倒肌膚瘡如苔藓勢若不可救此方特効

右石皂角剉三斤炭火熬久曬乾爲末濃煎大黃湯下一

七服旬日間眉髮再生肌膚悅潤眼目愈明

浴洗 治大風頑麻癩風紫癰白癰

麻黃根 地骨皮 草烏頭各二兩

右剉碎礬朴硝二兩和勻每用藥一兩水一桶紙一合熬三十根艾葉一兩同煎十沸用米醋一中盞又打勻去滓坐溫室中自用手巾搭四肢候湯可浴即浴令汗透面上如珠出更坐室中或睡片時尤佳汗解方著衣避風而出五日再浴如此浴二次浴罷便服換骨丹

換骨丹

九肋鼈甲 大蜈蚣細剉各

右以鹽泥固濟候乾火煨存二分性為末巴豆半兩去皮膜順手劈青州棗七枚去核入巴豆膏在棗中大燒令焦存巴豆五分性將棗巴豆碾爛如泥入煎二味末礬為泥

醋煮糊和丸如棗豆大每服七丸虛人四五丸用溫蠶汁下候利惡物如膿血爛腸即住三兩服未利更加三丸次服遇仙丹

遇仙丹

人參

紫參各一兩

苦參

白殭蠶去紫各二兩

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服三十丸食前溫鹽湯送下日二服次服疎風散

疎風散

山梔仁半兩

大黃

滑石

熟地黃各一兩

右為細末入朴硝半兩研令勻每服一錢食後淡茶清調下以用佛手膏

佛手膏

去黑紫瘡核

并貓七枚去

巴豆

杏仁二十枚

紅娘子去翅足

批霜八研

韶粉

黃蠟各半

槐角三條

菴豆

盆硝

瀝青

膩粉炒

亂髮略一

研黃

黃丹略二

清油四兩

右先將油煎令亂髮化次下紅娘子次下巴豆槐角等逐味下焦者濾出方下硫黃盆硝丹粉蠟等以簞子不住手攪令勻滴水中成珠不散為度以磁器貯之用時先將針刺瘡核用藥一粟米大故針處次日擠瘡有惡臭黑膿血出三兩日血漸少次服去毒丹

去毒丹

赤芍藥

白石

甘草各半

朴硝

大黃略一

巴豆五粒

黑牽牛二兩半

右為細末麪糊為丸如菴豆人每服十大丸加至三十丸臨臥時用金銀薄筭

甘草散

甘草

滑石

各半

大黃

一分

山豆根

一兩

右為細末每服一錢蜜湯調下日二服次服解毒丸

解毒丸

瓜蒌根

三兩

大黃

二兩

朴硝

二兩

甘草

半兩

右為細末麪糊為丸如棗豆大每服二十九加至三十九

白湯下次服黑神丹

黑神丹

訶子

四箇

黑牽牛

生

巴戟

炒各

甘遂

一分

赤小豆

主四十

九粒

右為細末麪糊和丸如棗豆大每服十九加至十五丸不

勻時用薄背湯送下次用水膏藥

傳貼破處及面脚上瘡令生肉

陳米

半升

馬蹄香

藿香

各一

麝香

二分

陳皮

去灰土半斤

右為細末入麝香用冷水調掃付瘡上有膿處如損破即煎槐枝湯洗再上藥此十方迺秘傳有驗大要病人須能如法將息理會敬而信之

三濟丸

治大風惡疾

川芎

當歸

熟地黃

荆芥穗

細辛

去葉

防風

各一

桂心

半兩

各剉碎先以醋一升浸一宿漉出焙乾再以生地黃一斤搗汁浸一宿焙乾再以酒一升浸一宿焙乾旋入乳香半兩以餘酒醋地黃汁浸蒸餅為丸如梧桐子大陰乾收貯後用好烏頭一箇炮裂剉荆芥穗半兩浸酒三升旋溫熱下藥五十九食遠服

八寶湯 淋瀝大風瘡

桑葉

荷葉

地黃葉

皂角葉

翦葉

蒼耳葉

葛蒲葉

何首烏葉

右等分曬乾燒存性為細末如面藥用洗手面身體大風惡疾瘡癢茶毒膿汁淋漓眉鬚墮落手足指脫頑痺痛痒顏色枯痺鼻塌眼爛齒豁唇揭病證之惡無越於斯負此病者百無一生

撥肌散 治大風疾年深久不能愈以至毛髮墮落鼻梁崩壞額顙腫破不至踰月取効如神

白花蛇

酒浸一宿

黑烏蛇

酒浸一宿

地龍

去土

沙苑蒺藜

蔓荊子

威靈仙

荊芥穗

甘菊花

苦參

紫參

沙參

天門冬

不賊

不灰木

赤芍藥

石菖蒲

川芎

定風草

何首烏

胡麻子炒

草烏去皮

蒼朮去灰米

木鱉子

甘草炙各

當歸

細辛

香白芷各一兩

天麻二兩

右為細末每服五錢七酒調下食後服酒多為妙

如聖散

治大風疾洗瘡藥大有神効

苦參

玄參

紫參

荆芥穗

沙參

陳皮

厚朴

頑荆子

麻黃去節各一兩

防風

白芷

蔓荆子

威靈仙各二兩

右為細末每用三錢桃柳枝各一把水五升同煎臨睡

時熱洗忌五辛物

黃精煎

治大風癩病面赤疹起手足攣急身發瘡癢及諸脚

已落者

黃精

生者十斤

白蜜五斤

生地黃

五斤

右先將黃精生地黃洗淨細剉以木石杵臼搗熟復研入水三斗絞取汁置銀器中和蜜攪勻煎之成稠煎為度每用溫酒調化二錢匕或三錢匕三夜一久服風癩痊平而如童子知年不老

治大風瘡

右用楓木子不以多少燒存性灰研研與輕粉等分用麻油調敷瘡上極妙如濕則乾擦之經驗方云昔章貢有鼓角匠生肉瘰因詰之云旧害大風得道人傳此藥今遂愈

蒿艾酒

治癩疾

右取白艾蒿十束如升大煮取汁以麴糯米亦如護酒法疾熟稍稍飲之但是惡疾遍體面目有瘡皆可服

治大風

雄黃

硃砂

滑石

阿魏

雌黃

雷尼炒

熬蘆炒

生犀角屑

硫黃

各二錢 斑貓

芫青

各去翅足糯米炒各用

黑皂角刺

焙七錢半

右為極細末每服一錢天明溫酒調下明日再服

白花蛇造酒方

治大風

每白花蛇一條熬米一斗缸底先用酒麴次將蛇用絹袋盛之懸於麴上然後槩和勻頻於蛇上用紙封缸口候三七日開缸取酒將蛇去皮骨為末每服酒一盞溫服蛇末少許仍將酒脚并糟做餅食之尤佳

治身上癩瘡

右以蒼耳子葉煎湯洗之

太醫院經驗奇効良方卷之五十三

新刊大醫院奇効良方卷之五十四

附論

夫醫之用藥如將之用兵諺云千軍易得一將難求決勝者良將也決敗者良醫也知兵之勝出於良將之機謀知人之病出於良醫之診視有軍無將則軍不能自勝有方無醫則藥不能自効蓋醫者人之司命也脉者人之大要也蓋醫家苟不明脉則如冥行索途動致顛覆矣人生其間雖病萬有不齊究其所以莫非運氣之所為也故醫之運氣猶儒之論理工之規矩鑑之光衡之雄舍之將何以焉蓋其道博其旨玄其法精其機妙知其要則一言而盡不知其要則流散無窮且如醫之十三科其中大方脉婦人科小兒科風科必先診脉後對證處方獨瘡科之流多有不診其脉候專攻治外或有證候疑難別召方脉診於瘡科之輩甘當淺漏之名噫其小哉夫瘡腫之生皆有

陰陽不和血氣壅滯若不診視何以知陰陽勇怯氣血聚散耶
由是觀之治療瘡腫診候之道不可闕也是以素問難經靈樞
甲乙及扁鵲仲景華佗叔和千金外臺聖惠總錄古今各醫諸
家方論中診候瘡科之詳至矣盡矣今遵前人之書略其瘡科
之脉開列于後

浮脉之診浮於指下按之不足舉之有餘再再尋之狀如太
過擊鼓然見於皮膚之間其主表證或爲風或爲虛浮而
大散者心也浮而短濇者肺也浮而數者熱也浮數之脉
應發熱其不發熱而反惡寒者瘡疽之謂也

洪脉之診似浮而大按舉之則泛泛然滿三部其狀如水之
洪流波之湧起其主血實積熱瘡腫論曰脉洪大者瘡疽
之病進也如瘡疽結膿未成者宜下之膿潰之後脉見洪
大則難治若自利者不可救治也

滑脈之診實大相兼往來流利如珠按之則累累然滑也其主或為熱或為風此陽脈也瘡疽之病膿未潰者宜內消也膿潰之後宜托裏也

數脈之診按之則呼吸之間及六至其狀似滑而數也若浮而數則表熱也沉而數則裏熱也又曰諸數為熱仲景曰數脈不時見則生惡瘡也又曰肺脈俱數則生瘡也診諸瘡洪數者裏欲有膿結也

散脈之診似浮而散按之即散而欲去舉之則大而無力其主氣實而血虛有表無裏瘡腫膿潰之後而煩痛尚未痊退者診其脈洪滑龐散難治也以其正氣虛而邪氣實也又曰肢體沉肺脈大即斃謂散者也

乳脈之診似浮而軟按之中央空兩邊實其主血虛或為疔血瘡腫之病診得乳脈潰膿後易治以其脉病相離也

長脉之診按之則洪大而長出於本位其主陽氣有餘也傷寒得之欲汗出自解也長而緩者胃脉也百病皆愈謂之長則氣治也

牢脉之診按之則實而弦且沉且浮而有牢堅之意若癰癰結腫診得牢脉者不可內消也

實脉之診按舉有力而類結曰實經曰邪氣勝則實又病則虛人得此最忌瘡疽之人得此宜急下之以其邪氣與歲府俱實故也

弦脉之診按之則緊而弦其似緊者為弦如按弦而不移緊如繩而轉動以此為異春脉浮弦而平不時見則為飲為痛主寒主虛瘡疽論曰弦洪相搏外緊內熱欲發瘡疽也緊脉之診似弦而緊按之如切繩而轉動其至切痛積癰也

人老腫浮之氣血沉瀯也亦主痛也

滿脉之診按之散而後來率之則細而不足肺滿則氣滿也亦主血虛瘡腫潰后得之坑好也

短脉之診按率則不及本位內經曰短則氣病以其无胃氣也諸病脉短皆難治也瘡腫脉短其氣短也

細脉之診按之則芤如蜘蛛之絲而欲絕舉之如無而似有細而微主亡陽衰也瘡腫之脉來細而沉時直者裏虛而欲變證也

微脉之診按之則軟小而微其主虛也真氣復者生邪氣勝者危瘡腫之病潰後微而勻舉自瘥也

脉之診按率來遲呼吸定息得三至其狀以緩而稍遲痼疾得之則善新疾得之則正氣虛憊瘡腫得之潰後自瘥緩脉之診按率似遲而稍駛於遲仲景曰陽脉浮大而濡陰脉浮大而濇陰脉同等謂之緩脉見長緩百疾自瘥凡諸

瘡腫潰后其脉滿遲緩者皆易愈以其脉候相應是有胃氣者也若芤則瀉血滿堅大實按之不減而有力者中焦有結伏在胃也微浮者積不消動心悸也

尺主下焦腰腎膝胫足中事也尺脉浮者風熱小便難也沉者腰背痛而腎氣不足數者臍下熱痛小便赤色而惡寒也遲者下焦寒而陰虛也緊者臍下小腹急痛也緩者腳弱下腫而痿痺也弱者下冷而腎氣衰也軟者腳不收而風痺小便難也伏者小腹痛而疝瘕穀不化也細者溇泄而下冷也芤者小便澀而下重也牢而小者足膝寒痺脚下隱也而痛也細者急者筋攣不能行也來而絕者男子小腹有滯氣也婦人月水不利也

瘡瘍當分歲所

經曰諸痛痒瘡皆屬心火又云營氣不從通於肉理乃生癰

腫只云膏粱之變足生大疔又云熱勝血則為癰膿又云地之
溫氣感則害人皮肉筋脉東垣謂溫氣外傷則營氣不行榮衛
者皆營氣之所經營也營氣者胃氣也運氣也營氣為本此逆
不行為濕氣所壞而為瘡瘍也但瘡瘍論中多言二熱相搏熱
化為膿有言熱化為膿者有言濕氣生瘡寒化為熱而為膿者
此皆瘡疽之源也當看是何部分所發所用之藥引經必先兼
見次之以脉別之是陰是陽用藥在乎王治宜以先瀉其榮治
瘡之本若不次序本逆而助火濕熱相合敗壞肌肉而為膿血
者當分而治之且如一歲之中火熱無過四五月之間是時諸
物皆不壞爛者六七月之間濕令大行之際近取諸身濕熱在
身豈不敗壞肌肉此理明矣大抵瘡瘍之疾經云六腑不和疏
結為癰要分臟腑之屬經絡之異六陰六陽之經有多氣少血
者有多血少氣者有多氣多血者不可一槩論之經言癰者榮

衛精留於經脉之中則凝而不行則衛從之而不通壅遏而不
得行故熱天熱不止熱勝則肉腐肉腐則爲膿然此不能陷骨
髓不爲焦枯五臟不爲傷故曰癰疽者熱氣純盛下陷肌膚筋
骨髓枯內運五臟血氣竭其毒下陷筋骨及良肉故曰疽疽者
皮堅上如牛領之皮癰者皮薄上以澤之是知癰者壅也六府
不和之所生淺而大也疽者沮也五臟不調之所致深而惡也
六府主表其氣淺故癰皮薄而腫高五臟主裏其氣深故疽皮
厚而腫癰皆親着厥府見於肌肉營氣不從氣血壅沮而生也
其所出之道有異者邪毒從虛而出也假令太陽經虛從背出
少陰經虛從鬚出陽明經虛從髕出腎脉經虛從臍出餘者從
經所出取焉今富貴之人不知其節以飲食炙煖高粱厚味醇
酒辛辣之物日久大過其氣味俱厚乃陽中之陽不能走空竅
先行於道反行於內通於肉理則溫氣六勝則令子母實火乃

大旺相火一虛必尅腎水腎既受尅積久水乏水乏則從溫熱之化而上行其瘡爰出背出腦此為大疔之最重者也若毒氣見於肺部之分或脾胃之分次也或見於他經又其次也或患溫毒流注止處無不潰爛故經曰高梁之變足生大疔受之持虛如持虛器以受物也無不受治大疔之法必當瀉其營氣以標本言之先受病為本非苦寒之劑為多則不能除其苦楚疼痛也諸瘡瘍性性多以乳香沒藥加以熱劑治之此理未為穩當若使經絡流通去其蔽府之壅滯佐以寒涼之劑其瘡自愈是以河間論瘡瘻昔火之屬須分內外以治其不若其脉沉實當先疎其內以截其源也其脉浮大當先托裏恐邪氣入內也有內外之中者邪氣至盛遏截經絡故發癰腫此因火於托裏及失疎通又失和其榮衛治瘡之要須以疎利為先次以托裏和其榮衛此三法乃內外之攻也若脉沉實發熱煩躁外无瘡

赤疼痛其邪在內氣以深矣當疎其肓府以絕其源又謂嘔呃
心煩脉沉而實腹硬不問而皮肉不變根深而病大邪亦在內
若肓府秘結急當疎利宜以黃連內疎湯加大黃服後以次序
調理若脉浮數瘡腫在外形證外顯恐邪氣極而內行故先托
裏宜以復煎散此為治法

一療癰馬刀經同證吳丹溪云夫癰疽初發必起於少陽經不
守禁戒延及陽明經大抵食味之厚營氣之積曰毒曰風曰熱
皆此三端招引變換治之須分虛實若實者依法調治速導味
發氣之物亦有愈者虛者誠為可慮以其屬膽經主決斷有相
火而且氣愛血少婦人若患此疾月經不調便作寒熱稍久變
為潮熱其證漸危自非斷慾息氣遠滋味神仙不能治本草言
夏枯草大治瘰癧散結氣有補養厥陰血脉之功能遇寒熱在
之以行散之藥加之以艾炙取其隨經之穴自然取效若何謂

之論瘰癧者經謂結核者是也或在耳前後連及頤頰下連缺
盆皆為瘰癧或在胃及胃之側下連兩脇皆為馬刀手足少陽
主之此經氣少血故多堅而少軟膿白而稀如米泔狀世俗
治馬刀求其水清者可治殊不知此經多氣少血之故在乎診
其虛實以調治之是以東垣治瘰癧馬刀以救若化堅湯或散
腫潰堅湯主之外以臨泣穴灸二七壯此證並屬手足少陽經
也惟瘰癧延及陽明之經故用藥有出入加減不同耳詳載於
試効方中瘰癧馬刀皆形質發於部分而命名也巢氏病源載
之三十六種千金聖惠所論瘰癧九漏總論說有風熱氣之三
毒之異瘰癧結核寒熱之殊其本皆由毒怒氣逆憂思過甚風
熱邪氣內搏於肝肝主筋故令筋畜結而腫或見於是何部分
先以五香連翹湯或牡蠣大黃湯疎下兩三行後服前藥調治
外用十香膏烏犀膏貼之如或將痊求瘰其將護忌慎治療之

法無造次焉

一肺癰肺痿內經云肺之癰喘而兩脇滿金匱要略又以肺癰肺痿並論辨之所謂熱在上焦者因熱為肺痿肺癰之病何從得之或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便秘又被陳利之藥重亡津液故得之若寸口脈數其人欬口中反有濁唾涎沫者為肺痿之病其口中辟辟燥欬又胃中隱上痛脈反滑數此為肺癰欬唾膿血脈數虛者為肺痿數實者為肺癰夫肺者五臟之華蓋也處於胸中主於氣候於皮毛勞傷血氣腠理虛而風邪乘之內感於肺也則汗出惡風咳嗽短氣鼻塞項強胃膈脹滿久久不瘥遂成前證輕則痿甚則癰聖惠曰中府隱隱而微痛者肺直也止肉微起肺瘡也中府者穴也在雲門下一寸六分乳肋間動脈應手陷中也是以候始萌則可救膿成則多死若欲知有膿者但診其脈若微緊而數者未有膿也

緊甚而數者已有膿也內經又曰血熱則肉敗榮衛不行必將
為膿大凡肺癰當咳嗽短氣脅痛時唾膿血久久如粳米粥者
難治若嘔膿而不止者亦不可治也其嘔膿而自止者自愈其
脉短而濇者自瘥浮大者難治面色當白而反赤者此火之尅
金皆逆為不治治法此證不得卧者葶藶大棗瀉肺湯千金方
黃芪湯並皆主之全在脉理分之若毫釐之差千里之遠慎之
慎之

一湯癰胃脫癰孫真人云卒得腸癰而不曉其病候愚醫治之
錯則殺人腸癰之為病小腹腫而強抑之則痛小便澀似淋時
時汗出後惡寒其身皮甲聳然腹皮急大如腫狀其脉數者小
有膿也其脉遲緊者未有膿也甚者腹脹大轉側聞水聲或透
臍生瘡或膿從臍中出或大便如膿血故治之以大黃牡丹皮
之類選而用之或外以灸法此腸癰之形證蓋可知矣胃脫癰

者何以別之內經云人病胃脘癰者診當何如當胃脘沉細沉細者氣逆逆者人迎反盛則熱聚於胃口而不行故胃脘為癰也諸書少論此病惟孫真人言此後學以此論乃胃熱為邪治之初以疎利為先次以消毒托裏退胃熱此為良法不識病者候人不淺可不慎之

一乳核失治必成癰疽丹溪云乳房所屬陽明乳頭厥陰所屬乳子之母或忿怒或厚味以致氣不流行竅不得通汗不得出則結為腫為痛陽明之經血熱則化為膿又有兒之口氣吹而吹熱次結成核初起時便須忍痛標散令軟血脉通和自然消散失此不治則成癰癰精要以神効瓜蒌散治乳癰蛇勞固是效捷付落之處藥恐未易得用蒲公英此草在露田野路割有之三月開花黃似菊味甘解食毒散滯氣入陽明太陰二經洗淨細碾以忍冬藤濃煎入少酒佐之服之即効若疎厥陰之滯

氣以青皮清陽明之熱以石膏行瀉火以生甘草消腫毒以炙
養子或加青橘皮皂角刺金銀花當歸頭或湯或隨宜加煨佐
以少酒仍加艾火兩三壯於腫處甚効切勿妄用針刀引惹拙
病又有婦人積憂結成隱核有如驚棋子大不痛不痒或一年
二年三五年者爲瘡破陷名曰妳瘍以其凹似癰穴也不可治
矣若初起之時便須消釋病根更宜清心遠慮薄滋味全要息
怒調理自有可安之理若婦人經行得此輕若六十歲左右味
牽鬱結而形實七情所干性急不調結核前證自覺神思不佳
不知食味便可用人參湯調青皮甘草末等分少入生薑汁細
細呷之一日夜五七次其核自消若不早治隱至經年以後如
勢不痛不痒必於乳下潰一穴出膿或經三五年雖飲食如舊
洞見五內乃死惟無夫婦人生者多若有夫婦人生者蓋積氣
之所流滯也故婦人夫乃婦之天得夫則陰陽和此證雖有而

治自愈無夫婦人得其瘕者以其穴之嵌深其可畏哉此者
必須早治必經歲月九死一生有一初嫁之婦患此只以青皮
甘草煎湯常服立安又一婦人十八歲得此證者性急脉實所
難者姑且與青皮一味煎湯與之間以加減四物湯服之不月
而安學者前人用青皮乃廢陰之藥四物湯行血分之功信有
理哉又有五發及諸瘡十三疔痔漏陰瘡時毒等證精義備載
其詳今略癰疽治醫之法條列于後

瘡科通治方

內托羌活湯 治尻癰生癰堅硬腫痛大作

羌活 黃蘗酒製各 防風 當歸尾

藥本 連翹 蒼朮 陳皮

甘草炙 肉桂三分 黃芪五錢

右作一服水一鍾酒半鍾煎至八分食前服

白芷升麻湯

治臂上生癰

白芷

一分

升麻

桔梗

一分

生黃芩

三錢

酒黃芩

四錢

紅花

甘草

半錢

當歸枯痛湯

治一切風濕熱毒浸淫瘡瘍下注濕毒脚膝

生瘡赤腫裏外糜瘡膿水不絕或痒或痛

方見脚氣門

內托升麻湯

治婦人兩乳間出黑頭瘡頂陷下作黑眼并

乳癰初起亦治

升麻

葛根

連翹

當歸身

黃蘗

各二錢

黃芪

三錢

肉桂

五分

牛旁子

甘草

各一錢

右作一服水一鍾酒半鍾煎至一鍾食後服

茈胡通經湯

治小兒項側有瘡堅而不潰名曰馬刀

范胡

當歸尾

生甘草

連翹

黃芩

牛旁子

京三稜

桔梗

錢各半

黃連

一錢

紅花

少許

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服亦治瘰癧此是攻裏

內消之劑

郭氏升麻牛旁子散

治時毒瘡發於頭面胃膈之際

升麻

牛旁子

桔梗

葛根

玄參

麻黃

甘草

錢各半

連翹

二錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

中和湯

治時毒瘡腫

羌活

川芎

葛蒲

牛旁子

防風

荊芥

漏蘆

麥門冬

前胡

甘草

錢各半

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

升麻和氣飲 治瘡腫癰疥痒痛

升麻 桔梗 蒼朮 乾葛

甘草 大黃一錢 陳皮二錢 當歸

半夏 扶苓 白芷 乾薑

枳殼各五分 芍藥一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

當歸飲子 治瘡疥風癰濕毒燥痒

當歸 川芎 白芍藥 生地黃

防風 白蒺藜 荊芥各半 何首烏

黃芪 甘草各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服或為末亦可

托裏十補散 治瘡腫托裏

人參

當歸

黃芪錢各二

厚朴

川芎

桔梗

防風

桂心

白芷

甘草錢各一

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

十六味流氣飲

治無名惡瘡癰疽等證

川芎

常歸

芍藥

防風

人參

木香

黃芪

官桂

桔梗

白芷

檳榔

厚朴

烏藥

紫蘇

枳殼

甘草錢各一

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

神効烏金散

治癰疽疔腫時毒附骨疽及諸惡瘡若瘡黑

陷如石堅煩渴老舊者服此發汗瘡起

火麻頭秋日

木賊去節

蝦蟆草頭

小草烏頭

樟皮節 酥炙

麻黃

蒼耳頭

五月三日

右礬乾各等分同入磁器內鹽泥固濟炭火內從早煨至申分如黑煤色為度礬為末每服二錢病重者三錢用熱酒調下如修合此藥必擇天晴好日於靜室中勿令雞犬除人見又名首功玄黑散

奪命丹

治諸般腫毒疽疔惡瘡

蟾酥

輕粉

白礬

寒水石

銅綠

乳香

沒藥

麝香

硃砂

三錢

蝮牛

二十箇

右為細末將蝮牛別礬爛入藥末同搗勻為丸如菉豆大如丸不乾入酒糊些小每服一丸生葱白三五寸病者自嚼爛吐於手心男左女右包丸藥在內用熱酒和葱送下如重車行五七里汗出為効重者再服一二丸

瘡酖丸

治疔腫一切惡瘡

瘡酖

輕粉

乳香

沒藥

各一錢

蓮花藥

川烏

硃砂各二錢半

麝香

半錢

右為細末麪糊為丸如豌豆大每服一丸病重者服二丸
依前法服之取汗

托裏榮衛湯

治癰疽疔腫及無名腫毒

桂枝 七分

人參

黃芪

紅花

蒼朮

芫胡

連翹

當歸身

羌活

黃芩

防風

甘草

各一錢

右作一服水一鍾酒一鍾煎至一鍾食前服

托裏溫中湯

治瘡為寒變而內陷者膿出清解皮膚涼心

下痞滿腸鳴切痛大便微澹食則嘔氣短吃逆不絕不得

安臥時發昏憤

附子

炮去皮二錢

乾薑

地

羌活

各一錢半

益智

丁香

沉香

木香

茴香

陳皮

甘草

炙各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

內疎黃連湯

治瘡皮色腫硬發熱而嘔大便閉脉洪實者

黃連

當歸

芍藥

檳榔

木香

六苓

枳子

薄荷

桔梗

甘草

各一錢

連翹

大黃

各二錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

托裏散

治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脉洪弦實數腫

甚欲作膿者

大黃

三錢

當歸

二錢

瓜蒌根

皂角刺

牡蠣

朴硝

連翹

各一錢半

金銀花

赤芍藥

黃芩銹一

右作一服水酒各一鍾煎至一鍾食遠服

破棺丹

治諸熱腫一切風熱瘡證發熱多汗大渴便閉譫

語結陽之證

大黃

生一兩半熟芒硝

甘草

各一兩

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服半丸病重者一九至二九食後童便入酒化服或白湯入酒化服亦可

瀉心湯

治瘡毒癰腫發燥煩渴脉實洪數者

大黃

四錢

黃連

山梔

漏蘆

澤蘭

連翹

黃芩

蘇木

各一錢半

犀角

一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

五香連翹湯

治諸瘡腫初覺一二日便厥逆喉中塞發寒熱

乳香

木通

大黃各半

連翹

沉香

木香

獨活

桑寄生

丁香

射干

升麻

麝香

甘草炙各錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

清涼膏 治初患癰腫瘡癤熱嫩疼痛消腫毒

大黃不拘

右為細末用漿水調攤貼之醋摩亦得

五香湯 治毒氣入腹耗裏若有異證於內加減

丁香

木香

沉香

乳香各二錢

麝香三分

右作粗末作一服水一鍾半煎至七分空心服若嘔者去

麝香加藿香一錢渴者加人參一錢

托裏護心散 治諸疔腫發背曾經汗下毒氣攻心迷悶嘔吐

而痛可服二三服

乳香 明淨者 一兩 真萊豆粉 四兩

右研細和勻每三錢不拘時甘草湯調服

定痛托裏散 治一切瘡腫疼痛不可忍如年少氣實先用疎

利後服藥

粟殼 去筋膜 炒二錢 川芎 當歸 白芍藥

乳香 沒藥 各一錢半 官桂 一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

乳香止痛散 治一切瘡腫疼痛不止

乳香 沒藥 各一錢 丁香 五分 粟殼

白芷 陳皮 甘草 炙各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

黃芪人參湯 治諸瘡破後食少無味及有虛熱穢氣所觸者

黃芪 二錢 人參 白朮 麥門冬

蒼朮 陳皮 升麻 五味子

當歸身 黃柏 炒 甘草 各一錢 炒麵 五合

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

竹葉黃芪湯 治疔腫諸瘡發熱而渴

淡竹葉 黃芪 人參 麥門冬

生地黃 川芎 當歸 芍藥

黃芩 石膏 半夏 甘草 各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

聖愈湯 治諸瘡血出多而心煩不安不得眠睡此亡血也

川芎 當歸身 生地黃 熟地黃

人參 黃芪 各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

內補黃芪湯

治諸瘡腫發背已破後虛弱無力體倦懶言語

食無味少睡脉滑自汗口乾並宜服之

黃芪

人參

茯苓

麥門冬

川芎

當歸

白芍藥

熟地黃

官桂

遠志

甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾食遠服

羌活散

治頑癬疥癩風瘡成片流黃水久不瘥者

羌活

獨活

明礬

白蘚皮

硫黃

狼毒各一兩

輕粉二錢

白附子

黃丹

蛇床子各半兩

右爲細末油調成膏搽之

烏蛇丸 治一切風癬多年不瘥者

烏蛇

酒浸去骨

白附子炮

附子片如豆

天麻各二

全蠍

炒

羌活

乳香

僵蠍各一

苦參

十兩

槐花半斤

右為細末用生薑汁一斤蜜一斤二味同熬成膏入藥和
凡如梧桐子大每服三四十九空心以溫酒送下
芥湯送下

內托升麻湯

治婦人乳中結核

升麻

連翹

青皮

甘草節各二錢

瓜蒌仁

三錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食後細細呷之

連翹飲子

治乳癰

連翹

川芎

瓜蒌仁

皂角刺

橘葉

青皮

甘草節

桃仁各二錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

牡丹湯 治腸癰小腹腫痞按之即痛小便如淋時時發熱自汗惡寒其脉遲緊者膿未成可下之當有血淋數者已成不可下

牡丹皮

瓜蒌仁

各一錢

芒硝

桃仁

去皮尖各二錢

大黃

五錢

右作一服水二鍾煎一鍾去滓入硝再煎數沸不拘時服

薏苡仁湯

治腸癰腹中疔痛煩毒不安或脹滿不食小便澀

婦人產後虛熱多有此病縱非癰但疑似間便可服

薏苡仁

瓜蒌仁

各三錢

牡丹皮

桃仁

各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

神仙蠟蜜丸

治腸癰內托神妙此藥不問老幼皆可服之無

不作効最止疼痛不動臟腑

黃蠟

半兩要黃色者一方用七錢

白礬

一兩要明者如研

右熔化黃蠟和礬為丸如梧桐子大每服二十九漸加至三十丸食遠用溫白湯送下

雙鮮散

治便毒內蘊熱氣外候寒邪精血交滯腫結疼痛

川大黃

三錢澤瀉

牽牛

白芍藥

桃仁

去尖各二錢 辣桂

甘草

各錢

右作一服水二鍾生薑五片煎一鍾食前服

復原通氣散

便毒初發用此

南木香

延胡索

天花粉

酒浸

舶上茴香

炒

白牽牛

炒

白芷

當歸

甘草

各一兩

青木香

半兩

穿山甲

酒浸炙焦二兩

右為細末每服二錢食前溫酒調服木香湯亦可

敷藥方

治便毒腫痛

雄黃

乳香各二兩

黃柏一兩

右爲細末用新汲水調敷腫處自消

牡丹散 治肺癰胃乳間皆痛口吐膿血氣作腥臭

牡丹皮

赤芍藥

地榆

若梗

薏苡仁

川升麻

黃芩

生甘草

各半

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

排膿散 治肺癰吐膿後宜服此排膿補肺

嫩黃芪

川白芷

北五味炒

人參各等分

右爲細末每服二錢食後蜜湯調服

香白木散 寬中和氣滋益脾土生肺金進美飲食

沉香

木香

乳香

丁香

藿香各五

人參

白朮

白茯苓

薏苡仁

山藥

桔梗

白扁豆

蓮肉

縮砂

粉草 各一錢

右爲細末每服一錢空心用紫蘇鹽湯調服或滾亦可有汗加浮麥煎湯調服

單方

治面目身體生斑或痒或癢子憧起不即治甚殺人

右用羚羊角燒爲灰研令極細以鷄子清和塗之極神驗無鷄子水和塗亦妙

治諸瘡腫不散者

右取白藥根爛搗傅貼乾則易之無生者用末新水調塗之亦得

牛旁藥方

治瘡腫

右用牛旁根三莖洗淨煮令爛於盆中研令細去筋膜汁中即下米糞粥醎淡任性服一椀甚良無忌

將軍鐵箍膏

治諸惡毒瘡紅腫突起用藥箍瘡四圍不令滋

蔓走疰毒氣

南星

大黃

蒼耳根

鹽霜白梅各一兩

白芨

白欬

防風

川芎各半兩

草烏

雄黃各三錢

右為細末先以蒼耳根霜梅爛和餘藥調成膏如乾入醋調得所於瘡四圍用藥作鐵箍塗上止留瘡高突處如藥乾以雞羽蘸水掃之日換二三次大妙

治諸瘡腫馬毒瘡

右以馬齒莧水煮冷服一升及塗瘡止治濕癬白禿以馬齒莧和灰塗之効治緊唇面腫搗汁塗之各用乾末水調塗治丹毒發背腫搗傳之不住者以藍靛和之更佳治多年惡瘡搗爛傳之尤良治三十六種風結瘡取馬齒莧一石水二石一釜煮之澄清內蠟三兩重煎之成膏塗瘡上

并服之

加味當歸飲子 治諸瘡瘍諸痛瘡皆為心火火鬱則發之

當歸 生地黃 升麻 防風

荆芥穗 何首烏 羌活 白芍藥

川芎 羌活 黃芪 紅花

蘇木 甘草 錢各一

右咬咀每服五錢水二盞生薑三片煎至八分食遠服沐

浴取微汗効速使血氣通和服之應効

麝香輕粉散 治血疳瘡陰蝕瘡耳疳瘡一切惡瘡皆治

麝香 輕粉 乳香 沒藥

白礬 飛過各一兩

右為細末量瘡乾貼

葵花散 治一切瘡

葵花

鬱金

黃連

黃蘗

施子仁各等分

右為細末冷水調成膏貼瘡痛處神効

神秘方 治一切瘡已潰者及灸貼之無痂生肉去膿

右用地黃汁一升松脂二兩薰陸香一兩羊腎脂及牛酥各如鷄子大先於地黃汁煎松脂及香令消即內羊脂酥更用蠟半鷄子大一同相和以慢火煎令水盡膏成去滓塗帛貼瘡日一二易

當歸和血散 治瘡瘍未發出內痛不可忍及治婦人產前產

後腹痛

當歸 二錢

乳香 半錢

沒藥 一錢

白芍藥 三錢

右為細末每服一錢水一中盞煎七分和滓溫服日二婦人酒煎瘡既發不須用瘡痒者加人參木香婦人服之加

赤芍藥

百合散 治頤頰瘡一名揭背瘡

百合

黃蘗

各一

白芨

一分

草麻子

五升

右為末用朴消水和作餅貼之日三五次

迴瘡金銀花散

治瘡瘍瘡甚色變紫黑者

金銀花

連枝葉俱用
剉碎二兩

黃芪

四兩

甘草

一兩

右吹咀用酒一升同入壺瓶內閉口重湯煮三兩時取

出去滓煩服之一方無黃芪

二金散

治大人小兒蝕透頤頰初生如末豆名含頤瘡

鷄內金

鬱金

右等分為末先用鹽漿盪漱了貼之

芙蓉傳方

治頤頰腫痛或破成瘡

芙蓉葉

不少

右楊爛傳之以帛繫定日一換

治蛇纏瘡

右用雄黃研為末以醋調塗仍用酒調服凡為蛇傷及蜂
蟻蜈蚣毒虫類大所傷皆可用之

鷄內金散

治穀道邊生瘡久不愈者

右用鷄胞脰不拘多少即是鷄胞內去下黃皮燒灰存性
研為極細末每用乾貼之如神

捨時從證

至元壬午有人王伯禄年五十有七右臂膊腫盛

上至肩下至手指色變皮膚涼六脈沉細而微脈證俱寒
舉瘍瘍醫參和視之曰此乃附骨癰開發已遲以燭起之
膿清稀解待日肘下再開之加吃逆不絕參和與丁香柿
蒂湯兩服稍緩待日咳逆尤甚自利臍腹疼痛腹滿飲食
減少時發腎憤於左乳下黑蒸露灸二七壯艾麝以乾姜

附子木香沉香茴香羌活類藥咬咀一兩半欲與服或者
曰諸痛痒瘡皆屬心火又當盛暑之時用乾薑附子可乎
予應之曰理所當然不得不然內經曰脉細皮寒瀉利前
後飲食不入此謂五虛吃逆者胃中虛極也諸腫瘡瘍皆
屬心火是定理也此證內外相反須當捨時從證非大方
幸熱之劑急治之則不能愈也遂投之諸證悉去故食進
蒼勢溫膿色正彥和又與五香湯數服月餘平復噫守常
者衆人之見知變者大事知常而不知變細事因而取敗
者亦多矣况醫乎守常知變豈可同日而語哉

托裏溫中湯 治瘡為寒變而內陷者膿出清解皮膚涼心下
痞滿腸鳴切痛大便微澀食則嘔氣短促吃逆不絕不得
安卧時有奔憤

丁香

沉香

茴香

益智仁

陳文

木香

羌活

乾薑

甘草

黑附子

乾薑

內經曰寒濕於內治以辛熱佐以苦溫以附子乾薑大辛

熱溫中外發陽氣自裏之表以為君羌活苦辛溫透關節

炙甘草甘溫補脾胃行經絡通血脈胃寒則嘔吐吃逆不

下食益智仁丁香沉香大辛熱以散寒為佐瘡氣內攻氣

聚而為滿木香茴香陳皮苦辛溫治痞散滿為使也

右吹咀作一服水三盞生薑五片煎至一鐘去滓不拘時

溫服心一切冷物

連翹散聖湯

治耳下至缺盆或至有上生瘡堅硬如石動之

無根名曰馬刀從手足少陽經中來也或生兩脇或已流

膿作瘡未破者並皆治之

連翹

黃芩

生用

為藥

當歸尾

京三發 初到 廣茂 初到 月三發 氣製一 草龍膽 酒製四

黃芩 酒製 黃連 酒製 蒼朮 酒製 土瓜根 酒製

訖胡 二錢 甘草 三錢

石件一半為末煉蜜和丸如粟豆大每服一百丸或百五

十九一半咬咀每服半兩水一盞八分浸半日煎至一盞

去滓臨睡熱服頭下脚高去枕而卧每口作十次嚥留一

口送下九藥畢如常

訖胡連翹湯 治男子婦人馬刀瘡

訖胡 連翹 知母 酒製 黃芩 各半兩

黃蘗 酒製 生地黃 甘草 各三錢 當歸尾 一錢

中桂 三分 牛旁子 二錢 瞿麥穗 六錢

右剉如麻豆大每服三錢或五錢水二大盞煎至一盞去

滓食後稍熱特服之

消腫湯 治馬刀瘡

芫胡

黃芩 生用各二錢 黃連

牛旁子 炒各半錢

黃芪

瓜蒌根 各一錢半 連翹 三錢

當歸尾

甘草 錢一

紅花 少許

右以咀每服半兩水二大盞煎至一盞去滓食後稍熱服

忌酒濕麪

重洗方 凡諸發及癰疽瘰癧腫瘡湯鹽火燒等疾或有別作

一種穢臭氣息不堪聞者最是惡證或已破未破或小或

大皆當作急治之可用忍冬藤一握搗細用無灰酒漚汁

服之以俾傳瘡四圍用雲母膏別研亦可剪開大口以護

其瘡之上埃其瘡出膿便以穢猪蹄湯等十分淨洗久洗

為妙洗一二時辰不妨次用後藥薰之

好降真香末

楓香末

右二末於鉢中攪熔丸如彈子大却取香爐一枚依爐口造紙煙筒一箇如燒龍涎香樣慢火烘之盡以煙筒口熏瘡上不拘丸數稍倦暫止然後更熏未出膿者即出已出膿者即乾直候生肌合口然後止向後有赤腫脚瘡又再熏大槩欲昇去穢氣也

四生散 治風氣上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡下症陰濕四肢燥癢遍體生瘡及婦人血風瘡

羌活

黃芪

白附子

沙苑蒺藜

右等分為細末用猪腰子一枚切開去筋膜入藥少許於內濕紙裹炮熟再入藥三錢浸酒調藥并腰子嚼與令盡服三五服後只用鹽酒調亦可或腰子一枚分兩次用羊腰猪腰皆可惟猪羊者為妙

牛金托裏散

治一切瘡腫發背疔瘡

黃芪

半兩

厚朴

防風

桔梗

各二錢

連翹

二錢

木香

沒藥

各三錢

乳香

二錢

當歸

半兩

川芎

白芷

芍藥

官桂

人參

甘草

各一兩

右為細末每服三錢酒一大盞煎三二沸和滓溫服

治疔瘡

黃連

羌活

青皮

白殭蠶

防風

獨活

蟬蛻

細辛

赤芍藥

甘草

各等分

右咬咀每服五錢先將一服入澤蘭葉少許薑十錢重同搗爛熱酒和服然後用酒水各半盞薑三片煎服病勢退減後再加大黃少許煎服略下一二行蕩去餘毒更用白梅蒼耳子研爛貼瘡上拔去根脚

返魂丹 治十三種疔瘡

硃砂

膽礬 各一兩半

血竭

銅綠

蝸牛 生用 各一兩

雄黃

白礬 各一兩

沒藥

蟾酥 各半兩

麝香 少許

輕粉 半

右將蝸牛蟾酥研爛餘藥研為細末同研和丸如鷄頭實大每服一九令病人先嚼葱白三寸吐在手心內將藥丸裹在葱內用熱酒一盞吞下如重車行五里許有汗出即瘡如不能嚼將葱研爛裹藥服之極有効驗

拔毒丹 治疔黃走機不止

當歸

赤芍藥

山梔子

牽牛 已上各二兩半

連翹

牡蠣

金銀花

紫花地丁 各一兩半

京三稜

甘草 各二兩

加大黃 三兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一九食前用童子小

便化開服忌酒生冷硬物

內托連翹散 疔瘡出時皮色不變及不疼痛按搖不動身發

寒熱便是此瘡有水疔魚臍疔紫燕疔火疔諸般疔瘡如
瘡黃於黃上用針刺仍服內托散自然消散

連翹 白芷 生地黄 赤芍藥各一兩

大黃去皮 黃芩去心 黃連去頭 薄荷葉各七錢 朴硝二兩

黃芩去心 甘草半兩

右為粗末每服一兩水一椀燈心竹葉煎七分其人喘加
人參少許大病只三四服愈如服了心煩嘔用不二散止
不二散

右以甘草半兩豆粉一兩分作二服酸齏水下

立馬回疔丹 治疔瘡走亂不止

金脚信 蟾酥 血竭 硃砂

沒藥已上各錢 輕粉

龍腦

藥香已上各

右為細末用生草為頭汁和作錠如麥子大用時將瘡頂

刺破將藥一錠放瘡口內第二日瘡腫是効

走馬赴筵丹 治疔瘡

沒藥

乳香

蓬砂

硃砂

雄黃

輕粉已上各錢 片腦

分

麝香少許

右為細末蟾酥汁和為丸如黃米大每服一九溫酒送下

奪命返魂散 治一切疔瘡增寒發熱昏悶不語腫遍皮膚不

思飲食並皆治之

大黃

連翹

山梔子

已上各二錢半研為細末

巴豆

杏仁各二錢黑色研為細末

牽牛頭末

苦丁香

各一人言五錢用大蒜五箇去心共入

右為細末研勻每服半錢病重者服一錢用新汲井花水

調下一服見効如病重無脉者與下藥約一頓飯時吐了藥便醫不得吐不了藥即活

滴滴金 治疔瘡

硃砂

輕粉

人言

雄黃

硃砂

錢各一

麝香

少許

右為細末每用些少先以針刺開瘡頭貼藥黃水出効

疔瘡錠子

硃砂 一錢

白芷

雄黃

蒼耳子

甘草 各半錢

右為細末用蟾酥汁和作錠子如前法用須五月五日合

回瘡錠子

治疔瘡大効

草烏頭

一兩

蟾酥

七粒

巴豆

七粒

麝香

一字

右為細末麝糊和就捻作錠子如有惡瘡透丁不痛無血

者用針深刺至痛處有血出以此錠子紐之上用膏藥貼之疔瘡四畔紐之其疔三二日自然拔出此藥最宜緊用此證大抵與傷寒頗類其中亦有可針鍊砭射出血者亦有久而敗爛出膿者其間變異百端不可不慎也

日本國傳治疔瘡塗方

巴豆十粒

半夏一枚

附子半枚

蟻蛭一枚

右各研爲末以人糞相和看瘡大小作紙圈子圍瘡口以藥泥瘡上綸貼之一日三易

五聖散

治疔瘡

皂角針二兩

瓜蒌一箇

大黃

金銀花

生薑

甘草各一兩

右咬咀用好酒二升同煎至八分去滓不拘時溫服

又方以鐵衣末用人乳汁和傳之立可

玉山韓光方

治疔腫

右以艾蒿一擔燒作灰於竹筒中淋取汁以一二合和石灰如麴漿以針刺瘡中至痛即點之點三次其根自拔亦大神効正觀中用治三十餘人得瘥

蟾酥膏

治疔瘡

右取蟾酥以白麴黃丹搜作劑凡如麥顆狀用指甲抓動瘡上挿入重者針破患者以一粒內之仍以水沉膏貼之水沉膏

右以白艾末半錢水盪內沉下澄去水却於皮紙上攤開貼在瘡上

治一切疔腫懸癰

右用蒼耳根莖苗但取一束燒爲灰醋汁藍靛和如泥先以針刺瘡上及四邊數下令血出度藥氣可以入針孔中

即去血傳藥乾即易之不過數度即拔根出其未結膿者即內消也已結膿破潰者再不用針刺只以藥塗之餘以葱口角上生疔腫造茸子板家母爲貼藥經十日不瘥餘以此藥塗之得愈常作此藥以救人無有不瘥者故特以傳後嗣丁腫方殆有千首皆不及此雖齊州萊姥方亦不能勝此物造次易得也

治一切疔腫

右用蒼耳草又名羊負來草只用根紅嫩者搗爛無灰白酒調勻服次用鹽梅肉研爛以猪膽汁和塗瘡頂上其毒即散又先用好京墨以薑汁研爛用薑片蘸墨塗四圍腫熱處即効一方用蒼耳根菜童子小便絞取汁令服一升日三或燒灰和臘月猪脂傳一方用苗葉搗汁飲之一方用子或葉或根研爛以米醋脚調塗腫處立散仍研汁服

以瘡爲度

治疔瘡

右於九月九日採芙蓉花葉陰乾研細用時以井花水調銀朱打成膏厚紙攤貼瘡上次日用蚰蜒螺即鬼丁螺一箇用銀器盛打破依前調藥却將蚰蜒螺放在瘡上貼待過週日揭起其疔自出立効其藥不要攤潤

治疔瘡

右用多年牆內或泥土中秀釘洗淨以炭火內煨紅醋淬待冷用刀刮釘秀又入火內煨紅入醋淬仍前刮末再煨再淬再刮下末研爲細末用時將瘡口撥開挑藥末在內以膏藥貼之少時如病深取疔如病淺即取出黑紫色血其瘡自愈

飛龍奪命丹

治一切惡疔瘡

半夏洗淨

硃砂

商星洗淨

人言二木

黃丹

血竭

乳香

沒藥

蓬砂

硃砂各二

巴豆十二粒

斑蝥十二粒

麝香半分

右為細末用糖酥汁和為丸如紅豆大五分中一分加斑

蝥二箇人言少許糖成錠子如半粒小麥大凡遇瘡針破

見血下錠子一粒以飯粒白酥封護用藥一丸窩在舌上

覺麻冷水下忌熱物片時重者隨服藥不必盡劑衝病

即止一伏時黃水流為病源先弄後疾先寒後熱如傷

寒病收忌房事并諸毒物魚腥凡病人眼見紅火光者難

治如蟾酥乾用些兒乳汁化開為度

立馬回疔奪命散

治疔瘡及喉痺乳蛾腫痛大効

杜鰲

當歸

牛旁子

白僵蠶各半

大黃 一兩

右咬咀每服半兩用宵石磨刀水酒各一盞煎去滓連進
二服疔瘡服後出汗者生無汗者死
治疔走了黃疔衰將死者

牡蠣

大黃

山梔子

金銀花

木通

連翹

牛旁子

地骨皮

乳香

沒藥

皂角刺

瓜蒌

右各等分剉碎每服半兩氣壯者加朴硝用水一椀酒半
椀煎一服定愈救命仙方也

芫花根膏

治魚臍疔瘡久治不瘥者

芫花根

二兩

黑豆

三合

猪牙皂角

五根

白礬

三兩

細研

右用醋一斗將前三味先浸三日於釜中以火煎至二升
去滓却入鍋中煎至一升入白礬末燒令勻去火成膏但

是魚臍丹惡瘡縫於帛上貼日二易之

治魚臍疔瘡

韭菜

連鬚葱

絲瓜葉

右八右鉢內搗爛如泥以酒和服以滓貼臍下如病在左手貼左臍下右手貼右臍下在左腳貼左臍右腳貼右臍如在中貼心臍並用布帛縛縛住臍內下紅線處皆白則可如有潮熱亦用此法却用人拖住恐其顛倒倒則難救治疔瘡陰證脉沉四肢冷瘡不發

右用五香散去大黃加蒼耳蓮肉酸棗仁藿香茯苓黃芪肉桂當歸防風白芷附子生薑半水半酒煎服以發藥性如潮熱皮膚受毒加生大黃並胡地骨皮

如嘔逆脾胃受毒加丁香

如喘嗽肺經受毒加杏仁

去皮

知母桑白紫苑

如眼花心經受毒加硃砂雄黃麝香

如脚冷腎經受毒加水瓜牽牛炒鹽

如發渴自汗肝經受毒加黃芩山梔

如大小便秘腹脹滿加枳殼炒木通苦蘗生用

治疔瘡陽盛潮熱心間霍亂或譫語六脈洪大

右用五香散熱不退而渴用不二散蛇床子大黃生為末

以冷酒或冷水調二錢止二服使微利

救生丹 治諸種疔瘡服內火光出昏迷不醒

右於三月辰日採桑葉葉用竹針穿成孔用紙裹風內

陰乾至端午日研為細末用蠶酥和為丸如小豆大用時

再以雄黃同藥一丸研細放右中汗出効

臘脂散 治反花瘡

臘脂 具

胡粉各一 蓬砂

沒藥各半

右研細先以溫漿水洗拭後傳藥

甘草塗傳方 治反花瘡

甘草半生 礬石灰 人中白 蜜陀僧各半

右為細末以童子小便半盞以無灰火熬用竹篦攪成膏

取塗瘡上日五次

惡實根塗傳方 治反花瘡並諸瘡積年不瘥者

惡實根研末 豬脂 二兩

右調和如糊塗瘡上日三四次

升麻湯 治心有風熱生浸滿瘡偏體

升麻 大黃剉微 黃芩去黑心 枳實炒

芍藥各一 當歸切焙 甘草炙各

右剉碎每服五錢七水一盞半燈心一握煎至一盞去滓

空心溫服

香攤瘡方 治面上耳邊生浸淫瘡有黃水出久不愈

殺羊鬚

荊芥

乾棗

去核各二錢

右燒灰存性研勻入膩粉半錢同研極細每用少許清油調塗先以溫湯淨洗拭乾塗藥二三次効亦治大人小兒兩吻生瘡

鷄冠血塗方 治卒得浸淫瘡不早治則連身周匝能殺人外

臺云浸淫瘡轉廣有汁多起於心

右以雄鷄冠上刺血塗傳日三五度

猪骨膏 治諸瘡口氣冷不瘥

猪筒骨

二錢

松脂

二錢通

乳香

另所

黃連

去鬚

白芨

研末各一分

鉛丹

別研

黃蠟

各半

右搗研熔蠟和為膏不拘時傳之

乳香膏

治諸瘡痛久不瘥

乳香

另研一兩

食鹽

松脂

杏仁

去皮尖研各一兩半

黃蠟

三兩

生地黄

取汁三合

白羊腎脂

半斤

右先熬脂令沸下杏仁地黄汁蠟煎候蠟熔盡八香鹽松脂煎以柳車攪令勻稀稠得所礪盒盛傳瘡上日三二度

雄黃散

治冷瘡暖瘡口

雄黃

研

百合

乳香

黃藥

炙去皮

墙上爛白蜆子

小蚌殼子各一合

右爲紙末研勻先用漿水煎甘草柳枝湯溫洗拭乾傳之

附子散

治冷瘡日夜發歇疼痛

附子

半兩炮川椒去目

雄黃

細研各一分

白礬

三分火煨研

臙粉

二錢

右爲細末研勻每用清麻油調傳瘡上日二換

黃芪湯 治諸瘡退風熱

黃芪 剉

黃芩 去黑心

麥門冬 焙去心

芍藥

甘草 炙剉各兩半

生地黃 四兩

半夏 薑製半兩

當歸 切焙

大黃 剉炒

石膏 碎

芎藭

人參 各一兩

右剉如麻豆每服五錢七用水一盞半竹葉七片煎至一

盞去滓空心溫服日三服

白蒺藜散 治熱毒瘡癰神壅躁

白蒺藜 剉炒去

白鮮皮

方風 去蘆

川大黃 剉炒

赤芍藥

梔子仁

子芩

麥門冬 焙去心

玄參

桔梗 去蘆

前胡 去蘆

甘草 炙赤剉各一兩

右爲細末每服二錢食後用薄荷湯調服

家陀僧散 治熱毒惡瘡臭爛久不生肌

家陀僧

雄黃

雌黃

定粉 各半兩

膩粉 三錢

右研為細末先用柳枝一握生甘草一兩槌碎以漿二升煎六七沸去滓稍熱淋洗瘡淨拭乾傅之

白金散 治風毒攻注遍身及手足生熱瘡疼痛出黃水

右用桂府滑石為細末先用虎杖甘草豌豆各等分約半兩許二椀煎上項藥至一椀去滓微熱淋洗瘡水冷拭乾上搽滑石末令通身便睡至明決愈

玉粉散 治熱汗浸漬成瘡腫痒炊痛

定粉 一兩

蛤粉 九兩

白石脂

白龍骨

石膏 各半

滑石 八兩

寒水石

燒通赤於淨地上放冷出火毒一兩

粟米粉 二兩

右為細末研勻每用些少乾擦患處

七寶散 治熱汗浸漬成瘡痒痛不止

黃芪

當歸

防風

荊芥穗

地骨皮

木通略二

白礬一兩

右為齏末每用藥一兩水三大椀煎五六沸瀝去滓稍熱淋漉患處拭乾避風少時東垣老人云此方城北獨柳店之客舍有推江軸者皮膚皴裂不任痛兩手不能執輦足不能履地而輒止宿因製此藥與傳之即効明日遂行自此累用屢効

赤石脂散

治瘡子磨破成瘡用此止痛生肌

赤石脂

細研

黃蘗

去粗皮剉

臘茶末

各半

白麴

二兩

龍腦

半錢

右為細末研勻每用時綿搥撲之

龍腦粉方

治瘡瘡痒痛

龍腦

一錢

粟米粉

五兩

右研細末先用棗葉湯洗後以綿溫撲之

玉女英 治癰瘡疼痛

滑石 半兩 研 藜豆粉 四兩 微炒

右研勻以綿溫撲之一方有棗葉一两

棟花粉傳方 治癰子癰瘡

右用若棟花不拘多少焙乾為末入蚌粉滑石末各少許

研勻日頻傳之

治暑月汗漬腋下赤腫及癰瘡

右以膩雪水和蛤粉傳之立瘥

皂子散 治水毒入瘡腫痛或刺入骨者

皂莢子 七枚 大蝦蟆 乾者一枚 胡椒十五枚

右用乾鍋入藥在內瓦蓋鍋口慢火燒烟盡取出研細每用藥先以溫漿水洗瘡口拭乾搽藥次以別膏藥貼之良

又水盡出有刺者即自見

鉛丹散 治破傷入水腫潰不愈

鉛丹

鉛粉 等分

右同炒令變色慘瘡口上水即出漸愈

連翹飲 治諸惡瘡紅赤痛痒心煩口乾及婦人血血風斑圓

點開爛成瘡痒痛流黃水汁

連翹

當歸

瓜蒌根

生乾地黃

荆芥

黃芩

赤芍藥

麥門冬

瞿麥

木通

牛旁子 炒

山梔子

防風

川芎

粉草 各等分

右咬咀每服四錢水一盞半燈心二十莖煎至八分去滓

不拘時服

秦繅蛸散 治諸惡瘡

桑螵蛸

地龍

貝母

黃蘗

各一

號丹

乳香一分

糯米粉

二錢麝香半錢

雄黃

輕粉

右為細末以新汲井水和沙糖調傅

洗瘡藥 治諸般惡瘡

貫衆

川芎

茵陳

地骨皮

荆芥

獨活

防風

地扁黃

甘草

當歸

右以咀水三椀煎三沸去滓通手洗之

效苦黃芪散 治諸惡瘡癰疽

黃芪

當歸

芍藥

瓜蒌根

甘草

各一兩 瓜蒌一分

金銀花

二兩 熟地黃 不拘

皂角

棘 為引

右吹咀每服半兩無灰好酒一升同引子裝入磁瓶內瓶
頭用筍葉封將瓶坐於鍋內上以火盆覆鍋口盆外以黃
泥封之勿令出氣煮至外聞藥香為度取出瓶澄定飲清
將藥滓再添酒一升依前煮服若酒少者酒水各半煮服
磨在上食後臨卧服在下空心服此藥治病萬無一失神
驗如谷應聲常於五月五日脩合

托裏金銀地丁散 治諸惡瘡腫毒疼痛服之如神

金銀花

黃連

當歸

紫花地丁

赤芍藥

黃芪

人參

甘草節

桔梗

大黃各半

乳香

白檀香

沒藥

連翹各三

子芩

梔子仁

玄參各二

麥門冬

去心前胡

甘草

微炙各一兩

右吹咀每服五錢水一盞酒一盞煎至八分去滓隨病上

下溫服

紫花地丁散 治諸惡毒瘡腫癰如神

紫花地丁 當歸 大黃 赤芍藥

金銀花 黃芪各半兩 甘草節二錢

右咬咀每服一兩用水一盞酒一盞同煎至一大盞去滓
隨病上下服

桃花散 治一切惡瘡生肌活血治金瘡去風

烏魚骨 虎骨 龍骨各一兩 寒水石半斤

白石脂 赤石脂 白欬各半兩 黃丹少許

右八白芨半兩同為細末量瘡大小敷貼

洗藥

白芷 荆芥 姜薤 何首烏

茯苓 苦參 川芎 白牽牛

防風

蔓荊子各一

右為細末用漿水四碗煎五七沸臨卧時洗淨塗後藥

塗藥

輕粉

白礬

舶上硫黃各等分

右為細末用酥油調臨睡塗三次

增益四物湯 治一切惡瘡

川芎

當歸

芍藥

地黃

防風

荊芥

甘草各等分

鳳尾草對量入

右剉碎每服三大錢水一盞半煎八分去滓食前溫服

龍葵散 治諸惡瘡多出膿水不乾

龍葵子天

景天即旗

黃連去屑

天靈蓋各一

龍骨

木鼈子

乳香

黃蜀葵花各半

右為細末入膩粉少許蜜調隨瘡大小紙攤貼之

萬寶代針膏

治諸惡瘡腫核赤暈已成膿不肯用針刺膿此

藥代之但用小針點破瘡頭却貼上膏藥膿即自潰此秘

妙良方

蓬砂

血竭

輕粉各一錢半

金頭蜈蚣一箇

蟾酥半錢

雄黃一錢

片腦少許

麝香一字

右為細末用蜜和為膏有瘡有頭處用小針挑破以藥些
小在熱花上封貼次早其膿自出如腋下有要核見名暗
疔瘡或有走核可於腫處用針挑破如前用之忌鷄羊魚
酒麪等物喫白粥三日為妙

細効方

治一切惡瘡醫所不識者

水銀

黃藥

黃連

松脂黃明

膩粉

土蜂窠黃聖上者南方多
有之或云關鎮窠
甘草各等分

右將水銀放掌中以唾津浸為泥入磁器中以生麻油和

研生絹濾如棉錫和藥末再研如稠錫先溫水洗瘡帛拭
乾塗之一切無名瘡塗一次即瘳有黃水者塗之隨手便
乾痒不堪忍者塗之立止痛甚者塗之立定治疥尤佳
破傳藥

拔毒散 治諸惡瘡消腫去毒

天花粉

無名異

黃蘗

黃芩

木鼈子

大黃

杜鰭

各等分

右為細末好醋調敷貼立効

烏金膏

治一切惡瘡

桑枝

槐枝

榆枝

枸杞枝

桃枝

柳枝

右各長一尺粗如小指俱一寸截劈四破用油四兩炒令
焦黑濾去滓入鉛丹半兩蠟一兩復熬令黑色傾在磁合

內候以新汲水浸出火毒用塗瘡

熊膽膏 治一切惡瘡

熊膽 研一錢

膩粉 半分

雄黃 研

麝香 研各半錢

積柳 研一

右研勻於蠟日用積猪膽一箇取汁和藥仍入在膽內用綿繩繫定揉勻以松明黑焰熏過黑掛於陰處如惡瘡有稍面大者用如黍米大貼之如錢大者用如菜豆大貼之恐藥乾難貼薄以律嚼調如稀糊塗之仍用薄樺皮蓋貼以帛子繫之藥不可多用

銀錠子 治惡瘡透不覺疼痛

銅綠 一兩

硃砂 二錢

煆酥 一錢

右為細末軟米飯一盞攪勻攪作錠子如粳米樣每用針刺之不覺痛者但有血出紐一錠子在內以膏藥貼之或

作散以紙擦蘸藥縫之

治蛇頭瘡 其形生時在手足上瘡傍一塊開如蛇口之狀痛

而流血不止者此藥治之

雄黃

蜈蚣

全蠍各一

右為細末者瘡濕癢開入藥擦在瘡上却以小油抹裁帛
栓住如乾小油調搽

一切惡瘡及沙虱水弩甲疽疼痛不可忍者

右用蟻蛭十枚端午日收搗為細末以油調傳之即易一
方取末以盞水調塗四圍如韭菜爛一方用蟻蛭二枚取
腸肚安在紙中心四面以醋糊貼瘡上

乳香散 治遠年惡瘡

乳香

膩粉各半

黃蘗去粗

龍骨

大黃三錢

麝香一字

右為細末先以若竹漚洗盡拭乾修上

水銀膏

治月蝕瘡多在兩耳上及竅傍隨月重虛

水銀

一分

胡粉

松脂

黃連

去鬚為末各半兩

猪脂

四兩

右先熬猪脂令沸下松脂諸藥末及水銀攪令勻磁盒盛
先以鹽湯洗淨瘡塗傳日三五度

治瘰癧方

鼠糞

苦參

桃枝

杉樹刺

柳枝

松枝

麝香

鷄子殼

皂角

雀糞

芍藥

木綿子

芝麻

桑枝

蛇殼

鍋底煤

松明

不拘多少

右并各四錢俱為細末先將松明槌碎和諸藥於瓦鉢中

掘一地坑將藥銚安坑中四圍用火焚焙取出再研令勻
傳者自然痊可忌一切發物

隔紙膏 治內外膿瘡

當歸 白芷 黃連 五倍子

雄黃 沒藥 血竭 海螵蛸

白芨 白欬 黃蘗 厚朴 乳香

黃丹 六分 乳香 半兩 輕粉 一分

右為細末研勻用清油調成膏用油紙貼藥傳瘡上絹帛
縛定有膿水解開刮去不潔再貼藥如此數次即愈須先
用燒鹽湯洗淨片帛拭乾待片時水氣乾然後貼藥

治膿瘡久不愈

龍骨 二升 輕粉 少許 檳榔 半兩 乳香

沒藥 各一 乾猪糞 半兩 洗

右為細末先以燒鹽湯洗瘡以軟絹帛拭乾清油調傳瘡
濕則乾瘡之

治瘰癧下注

白石脂

龍骨

各半

白礬

一升

五倍子

二兩

黃丹

三升

雄黃

少許

右為細末先將葱鹽湯洗瘡見赤肉然後將前藥傳瘡上
用藥如法厚者却用帛子包縛看不要動直候乾自脫去

瘡皮

治瘰癧

黃丹

輕粉

白芨

樟腦

敗船灰

各等

右研細末以桐油調成膏攤在油紙袋內先煎溫葱湯洗
淨以帛拭乾將藥置瘡上扎住用了一面番轉如前洗貼

一方無輕粉若用糞船灰亦妙

治膿瘡方 唐武子年三十歲時曾患此用之屢効

白芨

白欬

黃蘗

黃丹

另研各等分

右為極細末入輕粉些少研勻以煉蜜和成劑捏作餅貼瘡上候者填滿以帛片包扎一日一換后来瘡漸乾或有裂處只須乾搽以瘡為度

驢蹄散

治腎歲風毒下注生瘡

驢蹄

二十片

炭化

一分

輕粉

七

麝香

半

分

右研極細末以帛拭去膿用些少乾搽日三四次瘡

翠玉膏

治膿瘡

靛青

一兩

銅綠

研

黃蠟

各二

乳香

研

沒藥

研各

右將銅綠以油調勻將靛青蠟火上熔開下餘燒勻次入乳

沒末仍攪勻傾在河水盆內拌勻以油紙裹口嚼旋捏作餅子貼瘡以餅縮包直候瘡好其藥自脫

治血注脚

桑樹蓀

牛朶蓀

又名石灰竅生地上如有石成塊者碎其中有灰起

肥椶樹蓀

胎髮

男用男髮女用女髮三箇

右將三蓀焙乾各五錢胎髮燒灰存性三錢並為細末研勻濕則乾搽乾則清麻油調塗

治膿瘡方

冬青葉

臘猪膽

百草霜

二味和勻

右將冬青葉與本人嚼爛先以葱椒湯洗淨瘡口以膽霜傳後却傳嚼藥在上三四次即可

奇妙梔子散

治遠年日久內外膿瘡

山梔子

不拘多少麝香

乳香

另研各半錢

輕粉

少許

石研勻以磁器盛每用時先以葱白花椒煎湯洗淨瘡指
歇再以溫漿水又洗一次候惡水盡再將白水煎有沸
候溫再洗但瘡口無膿水血絲清水各盡又用粉帛片拭
乾然後傳藥如乾者香油調傳濕者乾摻但將瘡口實滿
軟絹帛護之堅硬不作膿者未可用腫如軟有膿者依前
法再洗後傳貼之三二次即愈乃一藥二洗之功也

治足瘡方 趙子固母劉氏年八十左足而一瘡下連大指上
延外踝以至膝骨每歲輒數發發必兼旬累月昏暮疼甚
抓搔獲時出血如泉流呻吟痛楚殆不可忍夜分即漸已
明日復然每一更藥則瘡轉大而劇百試不驗如是二十
餘年淳熙甲辰仲冬之末先生為太府丞一夕母病大作
相望悲泣無計因極就睡夢四神僧默坐一室傍有二長
榻子固亦坐因而發嘆一僧問其故子固答之以實僧云

可服牛黃金虎丹又一僧云硃砂亦好既覺頗驚異試取藥半粒強服之良久大痛舉家相相泣且悔俄而下福硯物如鐵石者數升是夕瘡但微痒不痛而無血數日成痂自此遂愈硃砂之說竟不復試先生因圖僧像如所夢者而記其事金虎丹出和劑局方本治中風痰涎壅塞所用牛黃龍腦腦粉金箔之類皆非老人所宜今乃取奇効意熱積臟腑而發於皮膚歲久根深未易洗滌故假涼劑以攻之不可以常論也神僧之夢蓋孝感云

牛黃金虎丹

牛黃

研二兩半

龍腦

生研五兩

膩粉

研二兩

雄黃

研一百五十兩

白礬

括過二兩

金箔

八十片

天雄

炮去皮

研

天南星

湯洗焙二兩

子焙乾如無牛膽

即用法酒蒸七晝夜

研

研

研

研

天竺黃

研五兩

研

研

研

研

研

研

研

石點細末煉蜜攪和每一兩半作十九以金箔為衣每服
一丸新汲水化下有孕婦人不可服

治臙瘡方

右用鱈魚數條黃色者尤佳打死先用油塗其腹下置瘡
上盤屈令過帛子繫定食頃覺瘡痛不可忍然後取鱈魚
看腹下有針眼大竅子皆虫也如未盡再以數條依上再
縛待虫去盡却用死人臙骨燒灰麻油調傅瘡上或以骨
灰一兩入好茶末二錢同調亦可

治臙瘡方

右先以蔥白菜水煮湯洗淨瘡口絹帛拭乾徐以輕粉末
搽上瘡口却用五靈脂黃蘗各等分碾為細末凉水調貼
敷瘡上紙蓋定二三次即平復

治湯火傷

大黃

黃芩

黃連

山梔子

黃蘗

知母

貝母

蜜陀僧

乳香

沒藥

輕粉

甘草

各等分

右為細末用鷄子清加蜜調不住手時、掃之

清涼膏

治湯燄火燒此藥止痛解毒潤肌生肉

梔子仁

黃連去鬚

白芷

各一分

生地黄二兩

葱白對薑

黃蠟半兩

清麻油

四兩

右細剉於油鍋中煎地黃焦黑色綿濾去滓澄清却於鍋

內入蠟慢火熬候蠟消傾於磁盒內用時以鷄羽搨少許

塗瘡上以麝為度

麻子膏

治火燒人肉爛壞

麻子

仁一合取

柏白皮

柳白皮

山梔子

白芷

甘草

各二

右剉細以猪脂一斤煎三上三下去滓以釜瘡上日三
黃藥散 治湯火傷

黃藥

大黃

朴硝

鷄子殼

寒水石各等分

右為細末用水調塗極効

止痛膏

治灸瘡及湯火傷日夜啼呼此藥止痛滅癢

松脂

羊脂

猪膏

黃蠟各一分

右取松脂破鉢中切脂嚼蠟膏松明上少頃鉢內燒諸物
皆消以杯盛汁傳之松明是肥松節也

神効當歸膏

治湯火瘡初起癰疽熱毒侵展炊赤痛毒氣壅

盛腐化成膿此藥斂口生肌拔熱毒止疼痛

當歸

黃蠟各一分

麻油四兩

右將當歸入油煎令焦黑去滓次入黃蠟急攪化放冷以

磁盒盛用時以故帛子攤貼一方用白蠟

栢葉散

治湯火傷

栢葉

梔子仁

各一兩

胡粉

研半兩

右為細末以羊髓五大合熔化和藥以木椎研三五百遍一日三次塗之差

蛤粉散

治湯火傷

右以蛤蜊殼不拘多少炙焦黃色搗為細末用生油調如膏傳之如水仍無痕一方以蜜水調傳之疼方止不膿不寂吳內翰居鄉中隣家釜翻一小兒自頭至踵皆傷急以傳之啼立止遂無恙唯綿傷隨手用即効少緩即不及當預先合以備用耳

紫雪

治湯鹽火燒疼不可忍或潰爛成惡瘡

右用松樹皮燒灰二錢漚青一分研為細末清油調傳濕

則乾糝忌冷水洗日三一方不用漚青以松樹皮陰乾為細末入輕粉少許生油調傳如傳不住額帛縛定即生痂
治湯火燒瘡

右以側柏葉入臼中溫搗令極爛如泥冷水調作膏傳傷處以帛子繫定三二日瘡當斂仍減癰一方燒灰存性為末以鷄子清調傳如乾再上或蜜調亦可或搗末以脂調塗瘡上乾即易一方以山栢子葉爛搗塗傳

治湯火傷

右用霜后芙蓉葉桑葉等分陰乾研為細末用蜜調塗傳之溫則乾糝

鷄黃油 治湯火傷

右用鷄子煮熟去白用黃於銀石鍋內炒乾再炒直待都化作油去火毒毛翎掃下入韶粉夜明沙為末香油調傳

原缺

川大黃 二兩 慎火草 五兩

右各搗空之乾即再換

治遊腫流徧身赤色入腹即死方

右用生猪肉傳上數數換之其肉虫為俱不食其惡甚也

玄參散 治癰腫始發熱毒氣盛寒熱心煩四肢疼痛

玄參

甘草

生劉各石膏 二兩

麥門冬 三升

前胡 去蘆

枳實 麩炒

人參 去蘆

赤芍藥

黃芪

赤茯苓

芎藭

生乾地黄

黃芩 各一兩

右咬咀每服四錢水一中盞入竹葉二七片小麥一百粒

煎六分去滓不拘時溫服

生地黃散

治發癰腫熱毒疼痛心神煩悶

生地黃 二兩

川大黃 劉

川升麻

地骨皮

當歸剉碎

黃芩

木通

赤芍藥

黃芪

玄參

甘草生各一兩

赤茯苓一兩

右為散每服四升水一中盞入竹葉二七片煎至六分去

滓不拘時溫服

連翹飲

治癰腫瘡癤疥癩

連翹

防風去叉各三兩

蒼朮

白芍藥

黃芩

去黑心

玄參各二兩

人參

白茯苓去黑皮

桔梗

剉碎

前胡去蘆

甘草炙各一兩

黃芪剉碎

桑根白皮

剉碎炒二兩

右搗篩每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服日二

內消散

治癰腫結硬疼痛

人參去蘆

瞿麥

白欬

川升麻

當歸剉碎

黃芩

防風

黃芪

沉香

甘草 生兩各 赤小豆 一兩

右為細末每服二錢不拘時溫水調服

解毒散 治癰瘡始竟便宜服

犀角屑

川升麻

川朴硝

赤芍藥

木通 劉各

石膏 二兩

玄參

麥門冬 去心

甘草 生兩各

右剉碎每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服

水澄膏 治癰腫

雄黃 水飛

麝香 各二

黃連

黃丹 水飛

黃藥

大黃 各半

右為細末量所腫處用藥多少以新汲水半盞抄藥在內
須臾藥沉澄去其浮者水盡然后用槐柳枝燒藥數百餘
轉如麪糊相似勻以小紙花攤藥貼腫處更以鷄翎擦赤

水不住掃之

天南星膏

治風毒癰瘡

大天南星

一两

厚黃蘗

半两

赤小豆二分

皂角

一挺不銹者
燒灰存性

右為細末以新汲水調成膏皮紙貼之已結即破未結即

散之豈効

牡丹散

治腸癰冷證腹濡而痛時時利膿

牡丹皮

人參

天麻

白茯苓

黃芪

木香

當歸

川芎

官桂

桃仁去皮炒

白芷

薏苡仁

甘草

二分

右為細末每服三錢用水一鍾煎至七分食前溫服

梅仁湯

治腸癰裏急隱痛大便閉結

梅核仁

四十九箇 去尖

大黃

二兩 牡丹皮 三分

冬瓜仁

四兩 芒硝 半

犀角

半

右剉如麻豆大每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服以
利下膿血三兩行為度

大黃湯

治腸癰少腹堅硬腫大如掌而熱按之則痛其上也

或赤或白小便稠數汗出增寒其脉遲緊者未成膿如脉
數則膿已成

大黃

剉碎

硝石

研 芥子

桃仁

湯浸去尖雙

右剉碎每服五錢水二盞煎至一盞去滓空心溫服以利

下膿血為度未利再服

四聖散

一名神効瓜蒌散

治腸癰上疽生於腦髑背腋乳便

毒服之神効

生黃瓜

去皮

粉草

研末

沒藥

研末

乳香

研末

右用好紅酒二大碗慢火煎至一椀分作兩服兩日服盡

大便順導惡物妙若乾瓜羹則用兩枚一方若病在上食

後服病在下食前服毒已結成即膿化為水毒未成即於

小便中出痰甚再合服以退為妙

桔梗湯

治男子婦人欬而胃膈隱痛兩腳腫滿咽乾口燥煩

悶多渴時出濁唾腥臭名曰肺癰小便赤黃大便多澁

桔梗

具母

當歸

酒浸

瓜羹仁

枳殼

薏苡仁

微炒

桑白皮

甘草節

防己

去粗皮各一兩

百合

黃芪

各一兩半

北五味子

甜葶藶

地骨皮

知母

杏仁 各半兩

右剉碎每服四錢水一盞半生薑三片煎七分不拘時溫服咳者加百藥煎熱加黃芩大便秘不利加煨大黃少許小便澀甚加水通車前子煎煩躁加白茅根煎咳而寒甚加人參白芷煎

四順湯 治肺腑吐膿五心煩熱壅悶咳嗽

貝母 去心

紫苑 去苗

桔梗 炒各一兩

甘草 炙剉半兩

右搗篩每服三錢水一盞煎五七沸去滓不拘時稍冷月如咳嗽甚加去皮尖杏仁三枚同煎小兒量減

治肺癰方

右用薏苡米爲末糯米飲調下或入粥內煮喫亦可一方

用水煎服當下膿血便愈

瓜蒌散 治便癰等惡瘡

瓜蒌 一箇 去皮

金銀花

牛旁子 炒各

生薑

甘草 各半兩

右將藥不犯銅鉛器搥碎用酒一大升煎數沸空心溫服微利為度

三物湯 治便癰

牡蠣

大黃

山梔子 各等分

右為末酒水一大盞煎七分露一宿空心溫服

治外腎癰瘡

枹鷄卵殼

鳶瓜黃連

輕粉 各等分

右為細末用煎過清油調塗

治腎癰

右用石礬熱水磨服

甘草膏

治水敷道前后生癰謂之懸癰乃肛門及膀胱處生

核子如橄欖樣或如梅李狀初不作痛至旬月漸熱不早治瘡潰膿血出日數碗有至腸腐而大便從瘡口出者其苦不可言近亦數月遠至一二年亦愈須是作核未痛以前治之不過一二服便自消此病初發如松子大漸如蓮子數十日後始覺赤腫如桃李即破若破則難治服此藥雖不能急消過二十餘日必消盡矣故兩服亦無害林院判京朝嘗患此疾已破服此藥兩服瘡即合甚妙

右用粉草半斤內用無節者四兩如筭子樣劈破取泉石間長流水以甘草入水中浸透以炭火將甘草煎水焙炙以一椀水盡為度不可急性劈開却將所炙甘草另用泉水三盞無灰好酒五盞用瓦罐煎至三之一如膏一起服

之立愈另用有節甘草四兩仍用泉水隨罐大小煎湯洗患處三遍其効如神水冷再溫洗

貫衆湯 治附骨離生肉上伏肉間淋瀝方

貫衆

地骨皮

藪精草

枇杷葉

枇杷去毛

荆芥

去梗

蜀椒

去目并合口

右搗篩以水三升煮取二升和滓淋瀝蘸布帛搦之

當歸散 治附骨離及一切惡瘡

當歸

半兩

甘草

二兩

山梔子

十二枚

木鼈子

一枚去皮

右為細末每三錢冷酒調服

密陀僧散

密陀僧

自然銅

各半

杏仁

去皮尖雙

七枚

右用苦竹筒一枚入藥在內紙封筒口慢火煨候筒黃色取出研極細看藥大小用藥以新汲水調勻用鷄翎掃塗

癰上甚者不過二七日効

內托黃芪柴胡湯 治附骨癰

黃芪 二升

柴胡 一升

羌活 半升

延胡 一升

官桂 三分

黃蘗 二分

生地黄 一分 土瓜根 酒製

當歸尾 七分

右咬咀作一服水三盞酒一盞同煎至一盞去滓熱服宿食消盡服一服而愈昔賈德茂男年十歲丁未四月十一日於左腿近膝股內出附骨癰不辨肉色漫腫皮澤木硬落勢甚大其左脚乃肝之脾土也更在足厥陰肝經之分少侵足太陰脾經之分其脉左三部細而弦按之緩而微有力一方無黃蘗

黃芪酒煎湯 治附骨癰

黃芪

當歸尾 各二升 柴胡 一升

升麻 七分

連翹

肉桂

桑寄生

絡黃蘗

甘草炙

右咬咀好糯米酒一盞半水一大盞半同煎至一大盞去
滓溫服空心宿食消盡服之待少時以早饒壓之使不令
大熱上攻中上二焦也丁未李春二十二日蒲虔主老羊
七十因寒濕地氣得府骨離於左腿外側足少陽膽經之
分微侵足陽明分闊六七寸長一尺堅硬漫腫不辨肉色
皮澤深但行步作痛以指按至骨大痛與藥一服立止再
日堅硬腫消

犀角湯 治石癰熱毒氣盛腫硬疼痛口乾煩悶

犀角鎔

木香分三

連翹

梔子仁

射干

當歸切焙

升麻

赤芍藥

玄參

枳殼炙

甘草炙

大黃分二

右劉碎每服三錢水一盞煎六分去滓不拘時溫服
黃連散 治石癰結硬發熱紫赤色毒氣攻衝未定日夜疼痛

宜用此消腫化毒止痛

黃連 川大黃 生 白欬 馬牙硝

黃蘗 醑 一 麒麟竭 青蘘 醑 半 赤小豆 半 合

杏仁 四十九粒湯 去皮尖新

右為細末蜜水調塗乾即易之

大黃散 治石癰腫硬疼痛心腹煩悶不得宣腸

川大黃 一兩 川芒硝 黑豆皮 枳殼 去穢炒

牛旁子 微炒 當歸 芎藭 醑 一 甘草 半 生 兩

右劉碎分作三服每服水半盞煎至五分去滓不拘時溫

服以利為度

治石癰堅如石未作膿者

右用生商陸根不拘多少熟搗傳之乾即易取軟為度及治溫漏諸癰癰半城人用此方取効者多

為藥湯 治胃皖積熱結聚為癰

赤芍藥

石膏

犀角 務

麥門冬

蒼朮

木通 各二

朴硝

升麻

玄參

甘草 生 各一

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分去滓不拘時溫服

雄黃散

治癰疽赤腫疼痛未得膿潰貼成膿

雄黃

細研

黃蘗

檳榔

川大黃

麒麟竭 各三

麝香 研

黃連 各一

白芷 二分

木香

芎藭

桂心 各半

當歸 三分

右為細末用臘猪脂調令勻塗於綿上貼腫處候膿潰后

即用膏藥搜膿生肌

玄參散 治癰腫成膿水不能下食心煩口乾煩渴飲水多四

脈羸瘦

玄參

黃連

去鬚

五瓜根

麥門冬

去心

赤芍藥

白鮮皮

各一兩

升麻

三分

川大黃

剉炒

火麻仁

川朴硝

各半兩

右剉碎每服三錢水一中盞入生地黃一分細切同煎至

六分去滓不拘時溫服

葛根散

治癰腫熱盛口乾煩渴或時乾嘔

葛根

黃芩

升麻

麥門冬

去心

瓜蒌根

赤芍藥

梔子仁

生地黃

各一兩

黃芩

三分

甘草

生用半兩

右剉碎每服四錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

沉香散

治癰膿潰已絕肌肉內腫尚有餘熱

沉香

柴胡去苗

黃芪

麥門冬去心

白朮二分

熟地黃二兩

黃芩

瓜蒌根

甘草生剉各半兩

右剉碎每服四錢水一中盞入竹葉二七片小麥五十粒

煎至六分去滓不拘時溫服

人參散 治癰疽內虛不足

人參

白朮

白茯苓

枸杞子略一

熟地黃

黃芪剉各二兩

桂心

白芍藥

當歸微炒

甘草炙各半兩

右剉碎每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六

分去滓不拘時溫服

黃芪散 治癰潰后補虛去客熱

黃芪

石膏略二

知母

麥門冬去心

白芍藥

白茯苓

桂心

熟地黄

人參去蘆

川升麻各一兩

甘草炙微赤

右剉碎每服四錢水一中盞煎六分去滓溫服日三四服

猪蹄湯 治一切癰疽腫毒消毒氣去惡肉凡瘡有口便須用

此湯洗

香白芷

不見火

黃芩去心

赤芍藥

露蜂房

取有蜂

當歸去蘆

羌活

生甘草

各等分

右為粗末看疽大小用藥如疽大加料用先將瘡前蹄

兩隻一斤只用白水三升煮軟將汁分作二次盪去面上

油花盡下面滓肉每次用藥一兩投於汁中再用文武火

煎十數沸去滓以故帛蘸藥湯溫上徐薄攤瘡上死肉惡

血隨洗而下淨洗訖以帛挹乾仍避風忌人口氣吹之有

狐臭人并月經見行婦人猫犬並不許入病人房洗瘡切

勿以手觸着洗疽之方所傳甚多唯此方極効其用露蜂房有理蓋以毒驅毒也

去水膏

治癰疽破穴后誤入皂角水及諸毒水以致疼痛

糯米粉

砂糖各三兩

甘草生末一分

右為膏攤在絹上貼毒水而出驢馬及尿糞一切毒水並皆治之

麥門冬湯

治癰疽潰后膿水不絕

麥門冬

去心黃芪剉

五味子炒

白茯苓去黑皮

人參去蘖

官桂去粗皮

當歸切

遠志去心

芍藥

甘草炙三分

右咬咀每服五錢水一盞半入生薑半分劈碎大棗二枚旁破同煎至一盞去滓空心溫服

清水膏

治癰疽及一切毒腫堅硬腫痛攻衝四畔焮腫抽熱

毒散腫氣

羊挑根

川大黃

黃芩

藁豆粉

黃蘗

各一兩

赤小豆

右為細末用芸薹菜取自然汁入蜜少許相和調藥令稀稠得所即看四畔腫赤處大小煎生絹上勻攤可厚一錢貼之乾即易

水調膏

治癰疽毒熱赤嫩疼痛

川大黃

生用去皮研末杏仁尖研

益花各三

方為細末研勻以新汲水和令稀稠得所旋即塗腫上乾即易之

乳香丸

治發背及一切疽瘡潰爛痛不可忍

乳香

別研

沒藥

別研

五靈脂

獨活

各三錢

當歸

真桑豆粉

交趾桂

川白芷

白膠香各半

右為細末煉蜜和充如彈子大每服一九細嚼薄荷湯送下手足損痛不能起者加草烏用木瓜鹽湯細嚼下

漏蘆湯

治疰作後二日服此退毒下膿可與五香連翹湯相

間連日服之

漏蘆

有白者

連翹

大黃微炒

黃芪

去蘆生用

沉香

各一兩

甘草

生用兩

右為細末每服二錢水一盞半生薑三片棗一枝煎湯食

前調服

四虎散

治發疽腫硬厚如牛皮按之痛

天南星

草烏頭

半夏

生用

狼毒

各等分

右為細末醋蜜調傳留頭出氣

沉香湯

治石疽腫毒結硬口乾煩熱四肢拘急不得卧

沉香

防風去叉

水香各三

麥門冬去心

當歸切焙

枳殼麩炒

獨活去重

羚羊角屑

升麻

玄參

地骨皮

赤芍藥

甘草

生剉各一兩

大黃剉炒

右剉碎每服四錢水一盞半煎至七分去滓不拘時溫服

漏蘆湯 治附骨疽

漏蘆

去蘆

升麻

連翹

麻黃

去根節各一兩

防己

木香

白斂

沉香

各二

大黃

剉炒一兩半

右剉碎每服五錢水一盞半入竹葉七片煎至七分入芒

硝一錢攪勻去滓空心溫服取利三兩行未利再服

應痛丸

治走注疼痛疑是附骨疽者

蒼朮

去皮

當歸

黑牽牛

草烏頭

各一兩

右為細末醋糊為丸如小豆大每服三十丸空心醋湯下

丹砂膏 治瘰癧

丹砂細研

射干

天黃剉炒

犀角屑

前胡去蘆

升麻

芎藭

黃芩去黑心

沉香

木香各一兩

生地黄二兩麝香研半分

猪脂半斤

右除丹砂麝香猪脂外剉碎以醋半升和勻浸一宿先熬脂令沸次下諸藥煎候地黄赤黑色以綿絞去滓入丹砂麝香末以枚許攪勻茲盒盛傳患處日三五上又取棗大以溫酒調空心日午服一方溫水調下半匙

枳實湯 治瘰癧

枳實

升麻

射干

熟地黄

黃芩

甘草

前胡三分

大黃一錢

犀角六分 麝香二分

右咬咀每服以水九升煮取三升下大黃一沸去滓內麝

香分三服

射干散 治癰疽皮肉中忽生點子如麻豆大或如桃李腫痛

不可忍

射干 川升麻 枳實熬炒 川大黃剉微

甘草生用各一分 麝香細研 前胡去蘆半 羚羊角屑三分

右剉碎入麝香令勻每服四錢水一中盞煎至六分去滓

不拘時溫服

防風湯 治風毒中人留血脉不散與榮衛相搏結成風疽身

體煩熱昏冒腫痛

防風去叉 柴胡去苗 白芷 麻黃去根節煎

木通剉 當歸切焙 羌活去蘆 附子炮去

桔梗炒

甘草炙

右劉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓食後
臨卧各一服如欲出汗空心併兩服後以熱薑稀粥投蓋
覆取汗慎外風

海桐皮散浸酒方 治熱毒風結成疽腫痛不得安

海桐皮剉

五加皮剉

獨活去蘆

薏苡仁炒

防風去叉

乾蝎炒

杜仲去粗皮

牛膝去苗酒浸各一兩

生地黃三

右咬咀生絹囊貯以好酒一斗五升浸於磁瓶中密封秋
夏三日春冬七日取食前溫酒三合或四五合不拘時甚
者常氣相續

松脂膏 治頭瘡經年不瘥

松脂

黃連去蘆各 黃芩

苦參各

蛇床子

一分大黃

白礬

各半兩

水銀

半兩

胡粉

半兩合水昆入山水

右為細末研勻用臘猪脂調傳瘡上大効

貝母膏

治頭禿瘡

貝母

半夏生

南星

五倍子

白芷

黃蘗

苦參

各半兩

號丹

煨半

雄黃

一分

右為細末先以蜂房白芷若參大腹皮荆芥煎湯熏洗拭乾即用蜜水調傳兩三次後乾慘藥

加味平胃散

治一切惡瘡頭上瘡

右平胃散入膩粉清油調傳之甚妙

鯽鮓散

治頭上生瘡俗曰粘瘡絕妙方

海鯽鮓

二分

白膠香

輕粉各半

右為細末研勻先用清油潤瘡后搽藥只一上可

治頭極痒不痛生瘡方

鷄鵲糞五合

右以好醋和膏煮三兩沸日二三次塗之

龜攀散 治脚爛瘡

竹蛀屑

龜燒灰

紅棗燒存性

黃丹

白礬煅

韶粉

右等分為細末搽之

龍骨散 治脚直并久遠惡瘡他藥不効者

白龍骨

半斤研輕粉半斤

檳榔研一錢

獾猪糞

不以多少新瓦上焙乾入火中燒令紅取出有性研為細末五升

右研和勻先以口含蘆水或溫鹽湯洗令瘡淨見肉却以

真麻油調藥隨瘡大小傳之未愈再傳三五日可

百草膏 治脚面惡瘡如相油浸淋延漫及治一切惡瘡不問
乾濕痛痒日近年深百藥不瘳者

右用羊糞二三十粒留瓦上四畔炭火燒烟住火竊餅於
地上以盞覆存性羅城白灰研細以紗片篩去沙土麻油
調敷痒入輕粉痛入麝香少許即効

神應散 治足大指角急為甲所入肉便刺作瘡不可着履靴
脚指濕爛婦人有此

右用礬石一物燒汁盡取末着瘡中食惡肉生好肉細細
割去甲角旬日即差一方加黃少許同研搽之

治脚指縫爛瘡

右用鵝掌皮燒灰存性為末傳之

治男子兩足癢痒生瘡連年累月俗為腎風瘡宜服此藥

黃芪

牛膝各半

羌活

獨活

川芎

防風

木香

白附子洗一

白茯苓一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心鹽湯

送下仍以後方藥傳之

搗棉

木香

防風

白芷洗一

白芨一錢

龍骨五分 麝香一分

蛇退燒灰

膩粉筒十五

右為細末研勻先以鱧魚一條洗碎百部一兩切碎南

三銖油一兩煎令得所去藥只以油搽瘡口却傳末藥上

以油紙裹之三日一換每上藥時先用柳枝并草煎湯洗

瘡淨拭乾傳藥

雄腦膏 治諸凍瘡久不瘥年年發敷先痒后痛然右腫破出

黃水及血出不止

雄雞腦

一按

黃蠟

各等分

清油燒半

右同於慢火上熬成膏去滓磁器盛每用塗瘡上

栢葉膏

治凍瘡手足指欲墮以耳欲落

栢葉

乾為

杏仁

去皮研

頭髮一大

食鹽半兩

乳香

研分

黃蠟

一兩

油一升

右先煎油沸次下煎五味藥待藥盡再下黃蠟撈勻磁盒

收先以熱小便洗瘡以綿挹乾後以藥塗即以軟帛裹勿

令寒氣侵入每日一換如瘡漸痊三四日一換

橄欖散

治腳凍瘡

右用橄欖核燒灰存性為末入輕粉油調塗

拔毒散

治毒瘡生於手指赤腫堅硬俗呼為發指撒骨疼痛

不可忍者

乳香

少許

泥蜂窠

壁間採

之研

右為末用醋調塗乾則以醋潤之痛立止

治惡指諺云天蛇頭

蜈蚣一條火

右以烟熏病指一二次即安

松脂膏 治肉刺

松脂 白膠香 各一 黃蠟 半兩

右於火上熔成膏冷貼用物繫定

無食膏 治肉刺

無食子 三枚 肥皂英 一挺

右燒令烟盡細研以醋醋於砂盆內別磨皂英如糊和末

傳之立効

薰硫散 治肉刺

薰陸香 石硫黃

右等分研勻塗肉刺上以燒釵烙之効

蟾酥膏 治肉刺

蟾酥五片湯浸膩粉一

右將蟾酥於盆子中以膩粉同和令勻先用針撥破頭邊然後塗藥裏裹之

蝦蟆散 治甲疽皮厚腫痛

蝦蟆灰半兩黃連研末膩粉各半辨蛇膽

麝香研雄黃研白礬五片研各鹿角七寸燒令

杏仁七枚炒黑

右研勻用臘猪脂調先以針刺破白皮煎湯洗瘡拭乾傳藥以油紙外裹更以綿帛裹之三日其刺肉刺甲皆當自落三日一換

白礬散 治男子婦人血風毒氣攻手足指生甲疽瘡久不差

若勞肉暴指甲疼痛出血不定用此藥肉乾磨

白礬

石膽各半

麝香

麒麟竭

朱紅各分

右將白礬石膽於鐵器內以炭火煨過入後三味同研令細每用少許乾磨上以帛子纏定日兩三更換之

蛇黃散 治甲疽腫爛脚指甲邊勞肉出時磨時發又治嵌甲生入肉常出血疼痛

雄黃半兩

蛇蛻皮燒灰存性一分

右同研細先以溫泔洗瘡上軟以尖刀割去甲角拭乾傳藥以軟帛裹半日許藥濕即易一日即除痛便止一方用漿水洗淨以橘刺撥破患處藥淋洗貼藥

雄蟬散 治瘡

雄黃通明

蟬這三箇研末

右研勻濕者乾捺乾者用津入輕粉少許調塗
黃蠟膏 治冬月手足析裂

右用清油半兩盞內慢火煎沸入黃蠟一塊同煎熔入光
粉五倍子末少許熬令稠紫色為度先以熱湯洗火上烘
乾即用藥傅以紙貼之其痛立止入水亦不落若合藥入
粉多則硬而成塊旋以火炙動挑傅不妨一方無五倍子
治脚跟皸裂痛不可忍

右用五倍子為末同牛骨髓調破器盛埋地中七日取出
填縫中即安

遇仙無比丸 專治瘰癧

白朮 防風 黑牽牛半生半炒

密陀僧 郁李仁湯泡斑蝥去翅足用糯米

甘草五錢上各

右為細末麝香為丸如梧桐子大每服二十九早晚煎甘草檳榔湯送下服至一月覺腹中微疼於小便中取下癰子毒物有如魚目狀已破者自合未破者自消

連翹湯 治馬刀瘡

連翹

瞿麥

大黃 三兩

甘草 二兩

右剉碎每服五錢煎服十餘日可於臨泣穴灸二十七壯服五六十日効一方加

大黃

水通

貝母 各五兩

雄黃 七兩

檳榔 五兩

不用甘草

右為細末每服二錢食遠調服

蝙蝠散 治瘰癧多年不瘥

蝙蝠 一箇

貓頭 一箇

右同燒作灰撒上黑豆煨其灰骨化碎為細末濕即乾摻

乾則油調傳內服五香連翹湯効

白花蛇散

治九漏瘰癧發於項腋之間或癰或不癰

白花蛇

酒浸去皮骨焙二兩

生犀角

二兩

牽牛

生一兩半

青皮

五兩

右為細末每服一匙入臍粉半匙研勻五更糯米飲調服

已時下惡物乃瘰癧之根也更候十日再服一服忌發風

熱毒物已成瘡者一日可効

四聖散

治瘰癧瘰癧服白花蛇散轉利后服此調之求其根

海藻

洗

石決明

煨

羌活

羌活

瞿麥穗

分

等

右為細末每服二錢米湯調下清水盡為度

螺灰散

大田螺

連殼燒存性

右為細末破者乾貼末破者香油調傳

散腫潰堅湯

治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或至

肩或於脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍於頸或至頰

車堅而不潰在足陽明經中所出或二瘡已破乃流膿水

並皆治之即時服藥斟酌病人飲食多少大便硬以意料

之則可

知母酒洗

黃柏酒炒

瓜蒌根酒洗 昆布

桔梗已上各半兩

廣茂洗炒

京三稜酒洗

連翹已上各三分

升麻六分

黃連

白芍藥

葛根已上各二分

當歸稍

柴胡

甘草已上各半錢

草龍膽四兩酒洗炒

黃芩稍

一升半一升半

右咬咀每服六錢水二盞先浸多半日煎至一盞去滓熱

服於臥處伸足在商處頭微低每嚥一口作十次嚥至服

畢依常安臥取藥仕胃中停畜也

另攢半料作細末煉蜜為丸如棗豆大每服一百丸或百五十丸此藥湯留一口送下更加海藻半兩炒

荔枝膏 治瘰癧

荔枝肉

一兩 輕粉

麝香

白豆蔻

川芎

砂仁 各半

硃砂

龍骨

白竭

乳香 各一

全蠍 五分

右將荔枝肉爛軟米飯和為膏者瘡大小攤貼如有三五箇者止去點為頭者妙

治瘰癧

右先於瘡上灸三壯然后用藥漬作瘡口用新活鱔魚截長一指大挑開就掩在瘡口上少時覺瘡內痒急揭起魚鯢魚上有細蟲如馬尾一節蟲出如捲三五次取盡蟲子后用飲瘡口藥

龍腦

乳香各一

麝香

粉麝

雄黃

輕粉各半

右為細末水糊為丸如小麥大每用一九二丸紐在瘡口內覺腫痛是効

瞿麥飲子 治瘰癧馬刀並治

瞿麥穗半斤連翹一斤

右為粗末水煎臨卧服此藥經効多不能速驗宜待歲月之久除也

治鼠瘻

貓兒頭一箇麝香一水

右為細末清油調傳

海菜丸 治瘰癧生於頭項上交接各蛇盤瘻宜早治之

海藻菜蕎麥白僵蠶微炒去

右等分為細末海藻菜旋炒研篩湯泡白梅取肉減半用
所泡湯為丸每服六七十丸食后服小兒飲送下食毒自
大便內泄去若與淡菜連服為妙蓋淡菜生於海藻上亦
治此病忌食腐鷄羊酒麪日五六服

治瘰癧不問有頭無頭者

右用大蜘蛛五箇曬乾細研酥調如面脂日二度傅之蜘蛛
絲用屋簷頭結網者其他不可用

又方

用黃鰐魚破開入草麻子二十粒在肚內以綿線定
於廁坑內放冬三月春秋二月夏一月取出洗淨用黃泥
固濟文武火煨帶性爛研為末香油調傅及治瘰癧

治瘰癧結核

黃芪七分

玄參八分

苦參

牛旁子

各九分

枳實

大黃

羚羊角屑

麥門冬

各五分

連翹

人參

青木香

蒼耳子

升麻

茯苓

甘草

桂心

朴硝各四分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大以酒下十九日夜三四
漸加至二三十丸以知為度忌生冷猪肉海藻菘菜生葱
酢蒜陳臭等物

琥珀膏

治頸項瘰癧初發如梅子腫結硬強漸若連珠或穿

穴膿潰肌汁不絕經久難瘥漸成瘻疾並皆治之

琥珀

細研

丁香

木香各三

桂心半兩

硃砂

細研

白芷

當歸

木鼈手去殼

防風

去蘆

木通

各半

黃丹七兩

垂柳枝三升

松脂

二兩

麻油

二斤

去除琥珀丁香桂心硃砂木香為細末餘藥細剉以油浸

一宿入鍋中以慢火煎候白芷焦黃漚出次下松脂末漚去滓再澄清油却入鍋中慢火熬下黃州以柳木篦不住手攪令黑色滴水中成珠不散者軟硬得所入琥珀等末攪勻磁器盛用時膏大小用火燭紙上勻攤貼

蜂房膏

治熱毒氣毒結成瘰癧

露蜂房

灸蛇退

玄參

蛇床子

黃芪

劉各

杏仁

亂髮

鷄子

蠟

二

右先將前五味劉細綿裹用酒少許浸一宿勿令酒多用油半斤內杏仁亂髮煎十五沸待髮消盡即綿濾更下蠟中然後下丹蠟又煎五七沸即瀉出於磁盆中盛取此膏上一日一換

鷄鳴散

治氣癰疼痛及熱毒結核或多煩悶熱而不寒者

牽牛

胡粉

大黃

朴硝

右為細末每服三次雞鳴時并花水調服以利為度如未

利再服

祛風丸

一名何首烏丸

治風毒瘰癧

何首烏

乾薄荷葉

玄參

精羊肉

羊肝

皂角

三十餅用十根火燒去骨十挺塗

右以皂角水煮肉使爛細研和藥為丸如梧桐子大每服二十九空心溫酒或薄荷湯送下

后溫水下

檳榔散

治氣毒瘰癧心膈壅悶不下飲食

檳榔

前胡

赤茯苓

牛蒡子

各一

人參

枳殼

沉香

防風

各一

甘草

一分

右剉碎每服四錢以水一盞入生薑半分煎至六分去滓
空心及晚食煎溫服

水紅花飲 治療癰腫核結硬不消及膿汁傍穿不瘥

右用水紅花不以多少一半炒一半生用粗槁篩每服二
錢水一盞煎七分去滓溫服食後臨卧日三好酒調亦可

又方 治療癰已破未破或膿血淋漓其効如神

牡蠣不以多少用更酥焙上以三斤甘草二兩

右研勻每服二錢食后以建茗同煎日二服忌魚酒鮓醬

油鹽海味等物

射干連翹湯 治療癰寒熱

射干 連翹 玄參 赤芍藥

木香 升麻 前胡 山梔仁

當歸 甘草炙各一兩 大黃二兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓入芒硝少許食后溫服日再服

瓜蒌子散 治瘰癧初腫疼痛寒熱四肢不寧

瓜蒌子微炒連翹 何首烏 皂莢子仁微炒

牛蒡子微炒 大黃微炒 白螺殼 旆子仁

漏蘆 牽牛微炒 甘草生

右為細末每服二錢匕食後溫酒調下

黑靈散 治漏瘡

牡蠣粉 號丹 硫黃研各一分 露蜂房別二分

右同炒令烟盡為細末入髮灰一分麝香少許和勻傅之

馬齒莧膏 治一切瘻

馬齒莧陰乾臘月燭燼各等分一作臘月鼠屎

右為細末以臘猪脂和先以溫酒清洗淨拭乾然后以藥

傳之月三

治漏瘡

右以五倍子末和血竭末塞之

治腸下生漏瘡如牛眼之狀膿水不止

右以鹽少許安白牛耳內然後取耳中垢以傳瘡上即瘥如不用鹽即牛耳不痒難取垢

海藻丸 治癰癤通用

海藻洗晒

川芎

當歸

官桂

白芷

細辛

藿香

白欬

昆布洗晒

明礬煨各一兩

海蛤煨

松蘿各七錢半

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後含嚥下

字癭丸 治癭瘤結硬

通草二兩

杏仁去尖

牛旁子各一合

昆布洗

射干

訶梨勒

海藻四兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食後嚥化日三

海藻酒方 治頸下卒結核漸大欲成瘰癧

右用海藻洗去鹹一斤酒二升漬一宿取一二合飲之酒

盡將海藻曝干搗末酒調一錢七日三服差如浸用絹袋

盛了漬春夏二日秋冬三日

木通散 治頸下卒生結囊欲成瘰

木通

松蘿

桂心

蛤蚧酥炙

白歛

琥珀

海藻洗

昆布洗各

右為細末每服二錢不拘時溫酒調下

治忽生瘰癧疾及一二年

右用萬州黃藥子三斤須緊重者為上如輕盍即是他州

者力須加一倍以無灰酒一斗投藥在內目濟瓶口以

燉火燒一伏時待酒冷即令患者時々飲一盞勿令絕
酒氣經三五日常把鏡自照覺消則停飲不尔令人項細
也用火時不可多惟燒酒氣香出瓶頭有津即止火不待
經宿也已醖如神忌毒食

五寶元

菖蒲 二兩

海蛤

白欬

續斷

海藻

松蘿

桂心

倒掛草

蜀椒

半夏 各一

神麴 三兩

羊靨 百枚

右為細末以牛羊脂髓為丸如芡實大每服一丸食后及
臨卧嚙化服

白頭翁丸

治氣瘕氣瘤

白頭翁

半兩 昆布 十分

通草

海藻

各

連翹

玄參 各八分

桂心 三分

白欬

六分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五丸用酒送下忌蒜麪生葱猪魚

針砂方 治氣癰

右用針砂浸於水缸中一日飲食皆用此水十日一換針砂服之半年自然消散

昆布散 治癰氣結腫胃膈不利宜服

昆布洗

海藻洗

松蘿

半夏湯炮

細辛

海蛤細研

白欬

甘草炙各

龍膽草

土瓜根

檳榔酥二

右為細末每服二錢食后溫酒調下

治癰氣胃膈壅塞頸項漸羸宜服此方

商陸

昆布洗各

射干

羚羊角鎔

木通

海藻洗

杏仁湯浸去皮尖雙

牛勞子

一枚半

右吹咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分去滓

不拘時溫服

治瘰癧神驗方

琥珀

桔梗各半

烏賊魚骨

昆布洗各

赤小豆

酒煮小麥酒煮各

右為細末煉蜜和丸如小彈大綿裹一丸常含燕津

水黃散 園腫毒

羣角屑

大黃

白芨

草烏皮尖

白欬

麝香

朴硝各等

右為細末蜜醋調薄攤油紙上貼之稍乾揭下再添潤溫

貼之即消

外用潰毒藥

治諸腫毒堅硬不消

升麻

薑根

秦艽子

地骨皮

金銀花

黃花地丁

甘草各等分

若為糞末每用五七錢水一升煎十沸於腫處四畔熱用冷則再煖

加沫消毒飲子 治搭腮腫

防風

荊芥

連翹

牛旁子

羌活

甘草各等分

右為糞末水煎三兩服散毒然後用藥塗腮腫處切不可便用藥塗毒氣入喉中不救

圓腫方

草烏

白芷

白斂

黃柏

朴硝各等分

石為末用藥醋調圓腫外即便收起

內托散 治諸腫毒惡瘡一服立愈

大黃

牡蠣各半

瓜蒌二箇山能

甘草三錢

右剉碎每服三錢水一大椀煎七分去滓溫服

無名腫毒或背疽治法腫圍定名鐵井欄

芙蓉葉

重陽前收

蒼耳

端午前收燒灰存性

右為末以蜜水調敷之

神効方 治疔腮及癰疽發背瘡癰等證並皆治之

右以赤小豆為細末以新汲水調敷瘡上及四邊赤腫處

乾則再傳之

犀角升麻湯 治陽明經絡受風熱口唇頰車髮鬢腫痛及鼻

額間連頭痛不可開口雖言語飲食亦相妨

犀角七錢

川升麻半兩

黃芩各三錢半

香白芷

白附子

川芎各半

羌活三字

生甘草一錢半

右以咀都作一服水五盞煎至三盞半去滓分作三服一日一服訖其證必減如臟腑有些澹不妨足陽明胃經也經云腸胃為市又云陽明多血多氣胃之中腥羶五味無所不納如市廛無所不有也六經之中血氣俱多腐熟飲食之毒聚於胃故此方以犀角為主飲食之毒陽明經絡環唇缺口起於鼻交頤中循頰車上耳前過客主人循髮際至額顙昔王公患此一經亦以升麻佐之餘藥皆滌除風熱升麻黃芩專入胃經故用有効

如米散治風邪熱毒壅滯肌肉榮衛不宣蘊積成腫血溢膚腠如丹之狀風隨氣行遊無定處邪毒攻衝城赤熱痛

朴硝

五兩

寒水石

蛤粉

各三

白芷

一兩

片腦另所

右為細末研勻每用新汲水調稀稠得所以雞翎塗掃不令藥乾

治一切赤腫但癰毒結未成者並可消

右用黃蜀葵花子不拘多少研細滴水令稀稠得所將絹帕子裹定旋梔所餘汁撲腫所四畔數撲之

犀角飲 治諸風腫

犀角 一錢

玄參

連翹

柴胡去苗各半兩

升麻

木通剉各

芒硝生用

麥門冬去心各

沉香

檀香

射干

甘草炙各

六剉碎每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服及夜食後各一服利多即減一名犀角湯無檀香

熨風散

治諸瘡因風致腫

羌活

防風

白芷

吳茱萸

細辛

當歸

芍藥

羌花

官桂各等分

右為齋末作二劑赤皮蔥連鬚細切半斤同醪醋拌勻炒令極熟帛裹於瘡上熨之稍冷即換藥熨之上下痛止

蠶沙熨方 治風腫

蠶沙

鹽各不拘多少

右相和炒熱布裹熨之冷即再炒或入醋少許尤佳
拔毒散 治熱毒丹腫遊走不定

石膏生用四兩

寒水石生用四兩

黃藥 甘草各一兩

右為細末以新水調搗之或紙花子小貼尤妙凉水潤之水澄膏 治熱腫痛大効

大黃

黃藥

麝香

天南星

白芨

朴硝

黃蜀葵乾一

右爲細末每用新水一盞半藥末二錢攪調勻候涎底者去浮水以紙花子攤於腫處貼之如急燥津唾潤之此藥除熱毒赤腫神効如皮膚白色者勿用之

十二件車方 治丹毒或得一物瘥

水苔

生地黃

生松葉

葫蘆葉

慎火草

浮萍草

豆豉水和

大黃水和

拖子水和

黃芩水和

硝石

豆葉

右一十二味但得一味搗以貼之即瘥赤小豆末和鷄子

塗之無鷄子水和用之

療竈丹從兩脚亦如火燒

右用五加葉燒作灰五兩取煅鐵家槽中水和塗之

治丹毒瘡

蜈蚣一條

白礬煅大

雷丸一箇

百部二錢

右為細末醋調塗之

除濕散 大治一切風毒疥癬癩痒狀如風癩

苦參

何首烏

荆芥穗

蔓荊子

薄荷略一

白芷

天麻

川芎

防風生

烏蛇酒浸一宿

右為細末每服三錢茶酒調下無時日進三服六日一浴

令汗出血氣宣通一月膚澤如故

苦參九 治遍身瘙痒癬疥瘡瘍

苦參四兩

玄參

黃連去鬚

大黃剉碎

獨活去蘆

枳殼麸炒

防風去叉各

黃芩去黑

梔子

菊花略一

右為細末煉蜜為丸搗千餘下丸如梧桐子大每服三十

丸食後漿水下日進三服茶酒任下亦得

八仙散 治遊風腫痒疥癬或因洗頭遊風癢痒生瘡

細辛

荆芥

白芷

川芎

黃芩

防風

地骨皮

甘草各等分

右爲粗末每用藥二兩水二椀煎十沸去滓熱湯患處

一掃散 治疥癬

防風

荆芥

苦參

地骨皮

薄荷

甘草各等分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五七十九空心用茶清送下或爲散涼蜜水調下不過三五服即瘥可大人用每服三錢

治遍身癢痒明目癢神

威靈甘草石菖蒲

苦參胡麻何首烏

藥末二錢酒一椀

渾身癢痒一時無

四生散 治賢臟風疥癬等瘡及眼目昏花視物不明

白附子

下注生瘡用黑附子

黃芪

沙苑蒺藜

羌活兩

右為細末每服二錢空心鹽酒調下若於猪腰子切開夾藥在內合定拴住紙裹煨熟尤妙又有患赤眼睛痛不可忍臨睡一服目及大痛至二鼓時乃得睡更三四服太愈再有頑癬經年服藥貼藥俱不効後得此藥三四服盡除此方治人腎臟風及眼疾頑癬無不効

芥藥神効散

治乾濕膿瘡諸種疥癬等證有効

檳榔

蛇床子兩

全蠍半兩

倭硫黃

半兩

右化開硫黃入荆芥末三錢滾數沸候冷加輕粉二錢冷再煨末加三柰半兩妙右寫細末先將小油滾過候冷調

上藥擦瘡上仍以兩手搓藥聞藥氣神効

一上散 治諸般疥癬必効

雄黃明手熟硫黃

黑狗脊

蛇床子各半兩

寒水石

六錢斑貓足研碎

右另研雄黃硫黃寒水石如粉次入斑貓和勻蛇床黑狗脊另為細末同研勻洗疥癬令湯透去茄油調手中擦熱鼻中嗅三兩次擦上可一上即愈如痛甚腫滿高起者加寒水石一倍如不苦痒只加狗脊如微痒只加蛇床子如瘡孔中有蟲加雄黃如喜火炙湯盪者加硫黃只嗅不止亦可愈

治一切男子人女人渾身疥癬一家染易經年瘡痒不効者

百部碎爛

亂髮

木香碎

檳榔

苦參

碎切各川椒三錢

鯽魚

一箇不要見水紅成片

右以油五兩煎藥得所去藥却用麝香一分膩粉十錢
硫黃雄黃各半兩同研令勻入在油內更煎攪五七沸瀉
出礬器盛之非時使也

五龍膏 治疥癬

硫黃

白礬

白芷

吳茱萸

川椒各等分

右為細末煎油調塗之

赤小豆散 治乾濕疥

赤小豆

三合炒乾內醋

升麻

薏苡仁

黃芪

三合 人參

白朮

瞿麥穗

當歸

切剉 黃芩

去黑皮 猪苓

去黑皮 防風

甘草

右為細末每服三錢七空心粥飲調下日二夜一

當歸飲子

治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍身瘡疥或痒

或痛或膿水浸淫或發赤疹瘡痛

當歸

川芎

白芍藥

生地黃

防風

白茯苓

荆芥穗

何首烏

黃芪

甘草

右為細末每服四錢水一盞半生薑五片煎八分去滓不
拘時溫服若於浴室內服此藥就用胡桃七箇去皮細嚼
下飲酒一盞出汗神驗

一笑散 治渾身疥癩瘡生惡瘡

檳榔

藁本

硫黃

蛇床子

枯礬

五倍子

白膠香

各等分

右為細末濕者乾傳乾者香油調傳如頭上瘡便搽上不
用剝甚者不過三五次平復如故

神捷散 治諸疥瘡

吳茱萸

白蒺藜 各一兩

白無名仁

輕粉 各半兩

赤小豆

九粒 石硫黃 研

右爲細末研勻每用半錢七生油調於手心內摩熱後偏指周身有疥處便睡睡覺其疥自愈

殺疥藥

羊蹄根

生切草烏頭 一箇 硫黃 一錢

白礬 半錢

生薑 一分

右以米泔淹一宿研極細入醋和勻入浴時抓破瘡傳之逢頃以溫湯洗去絕妙

治疥神効

狼毒

細辛

水銀 各一

輕粉 半錢

右爲細末油蠟和劑作兩凡綿裹兩手將於周身疥多處

擦之

備急萬氏療疥瘡方

右取棟根削去上皮切皂角去皮子等分熟搗下篩脂膏和搗疥去痴以塗之護風勿使女人小兒鷄犬見

無疥方

明信

雄黃錢半

硫末一錢

右研細用紙以方尺熱艾攤平穆勻捲成長缺尾兩口合紙捲子火點慢慢烟熏被下緊擁衾被油塗眼耳目鼻小兒只空衣蓋被卧亦効宜淨室溫床牢擁衾被無令透烟以熏至其人口鼻為効

丁香散 治一切癬

丁香 研

蝦蟆灰 各一分

白礬 研

五倍子 研

膩粉

右研勻乾傅癰上以瘥為度

胡粉散 治一切癰瘡癢痒甚者

胡粉 別研 雄黃 別研

硫黃 別研各一分 大草烏 生用

斑猫 一隻 砒 半

蜈蚣 七枚 麝香 少許

右為細末先用羊蹄根蘸醋擦動次用藥少許擦患處

銀粉散 治一切頑癬

輕粉 黃丹

瀝青 白膠香 各等分

右為細末麻油調拭淨或搨破竹篦挑搨二次便乾數次

剥去殼也治牛皮癬如神

水銀膏 治一切癰

水銀 二分 蕪荑仁 研末 薑黃 研末各一分 酥 二兩

右先煎酥和水銀以柳椎研攪候水銀散即下蕪荑薑黃

末攪勻盛盒盛旋取塗癰上日三兩次

三神丸 治一切癰

蕤薤

海桐皮

草烏頭

鹽炒熟去鹽不用

右為細末麪糊和丸如菰豆大每服十九至十五丸溫酒鹽湯任下

治癰神効

藜蘆根

半兩

輕粉

二錢半

右為細末凉水調搽癰上

治癰積年不瘥者

右用斑蝥二箇去頭翅足以針割燈焰上燒米醋內淬如此三兩次就燒成存性黑灰研為細末用紅棗一枚湯泡剥去皮核與斑蝥一處同研爛先以手拭或竺布擦動癰然後搽藥不可侵好肉恐有毒

半夏散

治一切癰

右以半夏三兩搗為末以陳醬汁調和如糊摩塗癰上日
兩三度即瘥

治頸項及面上白駁浸淫漸長有似癰但無瘡可治

右以鰾鱧魚脂傳之先拭剥上剉使燥痛後以魚脂傳之
一度便愈甚者不過三度

東坡先生家藏方

決明子

不以多少
為細末

右用水銀輕粉少許與藥末同研為膏散以物擦破癰上
用藥傳之立瘥

一林散 治乾癰不瘥

天南星

草烏頭

各一枚
生用

右為細末用羊蹄根搗絞取汁調塗不過三上瘥

治乾癰積年生茄核之黃水出每逢陰雨即痒方

巴豆十枚

右於炭上燒之令油出盡即於乳鉢內以少許酥和研如膏薄塗之不過一二度愈

治濕癬方

黃連

明礬各半兩

胡粉

黃丹

水銀各二

右為細末用猪脂油一兩夾研令水銀星盡散磁盒收用

螺殼散

治濕癬痒不可忍

螺殼一兩

亂髮灰

龍腦

胡粉各半兩

右為細末研勻以油旋和塗之

荆芥散

治多年濕癬

荆芥穗

不拘多少以瓦礫子盛鹽泥固濟尺許一窰用炭火燒候出清煙便換去吹用溫紙塞了窰子

故茶末

出研麝香一錢

膩粉五子

右研勻先以口含鹽漿水拭洗瘡令破帛子搵乾了以生油調藥傳之

八寶散 治風癩松皮頑癬久不瘥者神効予一鄉人患此疾數年不愈後忽有舊親傳此方試用有效

麝香

破故紙

檳榔

大腹皮

雄黃

輕粉

硫黃

白礬各一拓各兩

右為細末小油調擦日上三五次痒則擦之

定粉膏 治乾濕癬風癬不拘年月

定粉

水銀

蕪蔑

胭脂各一分

右同研勻用陳猪脂一两同研成膏先用湯洗後以膏子貼貼塗之一上便瘥本法猪脂須用三年以上者今若無但陳者亦可仍用後方淋洗

棟實

半升如無突根皮代之

棟葉及嫩枝細剉

瘦膏花及藤剉細各一升

枳殼去穢

蛇床子

地榆丹參

皂莢

苦參各三兩

右同煎濃汁熱洗患處

五倍子散治癬久不瘥

五倍子一兩火燒令烟盡

黃蘗剉

當歸剉炒

膩粉漏蘆

白礬煆一分

右為細末先用盞漿水洗拭乾傳之

黃連膏治一切久癬積年不瘥四畔潛侵復變成瘡瘡疱赤

黑痒不可忍搔之出血

黃連去鬚黃蘗去粗皮

肢細研

蔓菁子

杏仁湯浸去皮尖

水銀一錢

右先以水銀於掌中嚼研如泥次入乳鉢內下生油一合和勻次入藥末同研成膏磁盒盛日三五度塗瘡上

除毒湯 治小腸風陰瘡痒痛

木通 葉本 枳殼 貫莖

白芷 荆芥 甘松 薄荷

右剉碎用藥二兩水五升入芒硝半兩煎至三升去滓熱洗浴瘡

陰瘡膏 治男女陰瘡

米粉一餅 芍藥 黃芩 牡蠣

附子 白芷各十

右以咀以不入水猪膏一斤微火上煎三上三下候白芷

黃膏成絞滓去內白粉和傅瘡上

七寶橫柳散 治下元玉莖上或陰頭上有痒瘡漸至食透久

不愈者

橫柳 雄黃 輕粉 密陀僧

黃連

黃蘗

朴硝

右為細末和勻先以葱白漿水洗淨軟帛掩乾如瘡濕乾
摻如乾小油調塗

玉粉散 治下陰瘡疼不止

滑石

密佗僧

寒水石各半兩膩粉

麝香

各少許

右為細末油調傅或乾貼患處

全蠍散 治腎臟風發瘡痒

全蠍

三枚

明硫黃

二錢

生虢丹

一錢

輕粉半錢

鷄心楨榔

一錢大箇破開以好黃丹
一錢合在內濕熱畏風

麝香

少許

右為細末研勻磁盒收每用少許麻油調抹兩掌先以鼻
嗅男以兩掌拊外腎女以兩掌徐兩乳各臍至醒次日依
前再用藥發効

牡蠣散 治陰囊兩傍生瘡或陰濕水出其痒甚苦夜則拭之無足後必自痛或兩腿汗脚板心汗濕無可奈何此藥主之予親得此證受苦數十年得此方隨用二三日如法擦之二十年餘不發實為神効

牡蠣

黃丹二兩

枯白礬

四兩

右為細末遇夜睡時用手捏藥於陰痒處痛搽之不一時又搽之三四次後煩減次夜再搽雖大減又搽後自然平復如腋汗亦有煩搽方可脚汗先搽後裝藥靴或鞋底上脚板上塗藥纏脚裹之亦可

鹽剗散

治陰莖瘡

鹽剗

一分

豆粉

一分

右用水研塗上乾又傳之一方用豉一分

石灰散

治腎漏陰囊先腫後穿破出黃水瘡如魚口能致命

右用五倍子同石灰炒黃色去灰攤地火毒砂盆內研細末不犯銅鐵乾搽瘡上五七次可

丹胞散 治玉莖上生瘡臭爛者

右以猪肚一箇連尿去一半留一半用新磚兩口炭火煨新磚將猪胞連尿於磚上焙乾不住手一向移放於兩口磚上輪流不歇莫與火煨過胞以尿乾為度研為末入黃丹一錢先用葱湯以鵝毛抹洗以舊綿帛蘸乾此藥搽三五次立見効

地連散 治玉莖上生瘡

右用地骨皮煎湯洗以訶子連核燒存性為不乾搽

川連散 治不部注瘡

右以宣連為細末漿水調成餅攤於枕面上內用艾及穿山甲三片燒烟覆碗熏成黑色再取下如是者五次以黃

連餅黑色為度地上出烟毒再研細濕則乾坐乾則清油調塗三四次先用黃柏囊香茵陳煎湯濕洗

神妙方 治莖頭三五孔小漏瘡出血微膿

右用油髮燒作灰存性研細傳之乾則津唾調傳仍以米湯調髮灰食前服

治殺道中瘡

右以水中蔣葉細搗綿裹內下部日三

小浴方 治虛勞陰濕痒生瘡

川椒 苦參 蛇床子各一兩半 香附子

白礬 白芷 狗脊 細辛各一兩

桂心 三分

右咬咀每用藥一兩以水三升煎至二升去滓傾入盆子內但乘熱氣坐盆子上熏之良久通身便洗患處甚者不

過三兩度

沐浴長春散

治男子下元陰濕久冷陰囊左右夜痒抓之則

喜住之則痛或瘡流水為害甚苦此藥見初及治婦人下部陰濕胎元又冷

牡蠣

蛇床子

破故紙

紫稍花

官桂

乾荷葉

葉

右咬咀每用一两半水一小鍋入葱白數莖煎至八分去

滓先熏後洗却用後藥

枯礬

一两

黃丹

蛤粉

各半

右研細末熏洗後以手捏藥末擦濕痒處

銅綠散

治男子婦人陰部濕海瘡

銅絲

少許

白礬

一錢

乳香

半錢

輕粉

一字

五倍子

半兩

研

右為細末洗淨搽之

青黛散 治下部生濕瘡熱痒而痛寒熱大小便澀食亦減身

面微腫因多食魚蝦發風熱物得之

右用馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻塗上立有神
効仍服八正散日三服

麝香散 治妬精瘡痒而濕者

麝香

黃礬

青礬各等

右為細末小便後用些少傳之

治陰濕生瘡黃水流注

白礬

不以多少

右研為末先以冷水洗瘡淨然後傳之

津調散 治妬精瘡膿汁淋漓臭爛

黃連

款花

各等

麝香

少許不用

右爲細末先以地骨皮蛇床子煎湯洗軟帛拭乾津潤傳之忌生湯洗

洗毒湯 治陰蝕瘡

苦參

防風

露蜂房

甘草

各等分

右以咀水煎濃汁洗瘡

胭脂散 治陰瘡

坯子胭脂 真菜豆粉各等分

右同研勻傳之

蝦蟆散 治陰濕欲盡瘡痛甚者

蝦蟆燒灰 兔糞一兩

右同研細每用少許傳瘡上日三四度

截疳散 治年深疳瘻瘡大効

白芨

白欬

黃丹

密佉僧

各一兩

黃連

半兩

輕粉

一錢

片腦

麝香

各半

右為細末和勻每用或摻或絀瘡中以膏藥貼之

甘石散

治下部疳瘡

煨甘石

密陀僧

各一錢半

輕粉

一分

橡斗子

燒灰存

龍骨

半錢

麝香

少許

右為細末先用荊芥杜仲川椒煎湯放溫浴洗罷然後用

藥一檢乾貼

金銀花散

治下部瘡

金銀花

荊芥

朴硝

蛇床子

甘松

白芷

檳榔

各一

右咬咀每用五錢水五碗加葱白二根同煎數沸盆盛水

先熏後洗却上藥

槐子散

治下部瘡

右用梔子一箇去穢裝入明礬末麪糊合口火燒存性為末洗淨乾摻上隨効

銀粉散

治下疳陰頭生瘡

右用牆上白螺蛳不以多少火內煨酥為末於水內飛過去土不愈者次用輕粉隨分兩入在藥內每用少許乾貼在瘡上

治下疳瘡

右以孩兒茶研為細末先洗淨乾則小油調傅濕則乾摻之神効

消毒膏

治五發惡瘡消腫散毒

黃芪

當歸

川芎

杏仁

白芷

白欬

零陵香

槐白皮

柳枝剉者

木鼈子仁

甘松各半兩

乳香

沒藥各三錢

麝香

朱紅

硃砂各半錢

黃丹炒紫

黃蠟各半斤

芝麻油一斤輕一錢

右將藥剉碎油浸七日木炭火上煎杏仁焦色濾去滓下黃蠟候熔開出火下丹急攪百十轉下乳沒麝等六味不住手攪至凝磁器內收貯白光絹攤貼之

烏龍德生膏 治一切惡瘡腫毒及治小兒脾癖堅硬等疾

黃芪

青木香

連翹

木鼈子去殼

玄參

生地黃

桃仁去皮尖

金銀花

防風

川芎

白芷

羌活

白芨

白欬各二

亂髮灰

草麻子三百粒去殼

桂花頭半兩

五香連翹散

人參敗毒散

復元通氣散

十奇內補脾膜散各半兩

右將前藥吹咀用小油三斤半入鐵鍋內先浸五日却用

慢火煎至藥黃黑色以槐柳條一握不住手攪再用鹽漬
濾去滓和淨油三斤先將黃丹一斤半炒黑色下小油一
處於慢火上再熬得所滴入水中不散成珠下後藥

雄黃

血竭

乳香

蜜陀僧

沒藥

輕粉

龍骨

楓香各半兩

麝香一錢

加蘇合油半兩

右研為細末入煎膏內化開攪千餘遍令勻又拭水中得
所成膏藥可攤為度如堅少加小油如軟加黃丹須要攪
勻成膏切忌鷄犬婦人孝子見須誠心靜意脩合如小兒
諸癰脾疳等證量病堅硬大小用紙或緋絹攤貼候藥力
盡自脫下再換小兒疳瀉痢證貼在肚上咳嗽貼脊梁中
心其病自愈

摩風膏

摩風止痒消腫定疼治頭面唇鼻諸瘡肌肉裂破

當歸 去土 白芷 杏仁 去皮 桃仁 去皮

藿香 去土 檀香 零陵香 川芎 各三錢

沉香 木香 白附子 天麻

獨活 白芩 白欬 各一錢半 黃芪 去粗皮 兩一錢

防風 茅香 白芍藥 甘草 各二錢半

木通 一錢 瓜蒌 儀割 一百 龍腦 研 四錢 黃蠟 夏十二兩 半冬九兩半

石剉藥用清油二斤二兩浸七日淨石器銀器中慢火煎

候白芷微黃綿瀝去滓於淨磁罐內密封澄一宿再瀝過

於磁掬中慢火再輕溫熬動次下黃蠟攪勻放溫次下研

細龍腦參同於磁盒內盛每用少許摩擦患處

太乙靈應膏 治諸般惡毒惡瘡並不外貼內服一九如櫻桃

大蛤粉為衣各隨後項飲子服之亦治杖瘡

玄參 大黃 官桂 生地黃

白芷

赤芍藥

血竭

乳香乳上各

紅花

黃藥

地榆

防風

沒藥乳上各

槐花

黃芩二

猪牙皂角三

羌活四錢

劉寄奴四

杏仁二一放

當歸尾一兩

右剉碎以香油一片浸春夏三秋七冬十日浸畢用文武火熬藥枯焦如炭然後退火令其自冷將蠶布一幅濾去滓將油再入鍋內熬先以黃丹十兩新瓦上炒丹紫色研細每熬油一沸入丹二兩熬至五沸入丹畢前後俱用柳條攪之待熱水中凝而不散方成膏待藥溫用磁器盛貯下用水浸三兩日去火毒然後攤貼患處內服藥引子見神仙太乙膏下

神仙太乙膏

治八發腫疽及一切惡瘡軟癰不開年月深淺

已未成膿並宜治之蛇虎傷螫犬咬傷湯火刀斧所傷
皆可內服外貼如發背先以溫水洗瘡淨軟帛拭乾却用
緋帛攤膏藥貼瘡即用冷水下血氣不通溫酒送下赤白
帶下當歸酒下咳嗽及喉閉纏喉風並用新綿裹膏藥置
口中含化一切風赤眼用膏捏作小餅貼太陽穴後服以
小梳子湯送下打撲傷損外貼內服橘皮湯下腰膝痛者
患處貼之內服鹽湯送下唾血者桑白皮湯下諸漏先以
鹽湯洗淨諸瘡並量大小以紙攤貼每服一丸如撥桃大
蛤粉為衣其膏可收十年不壞愈久愈烈一方以遠癰癰
同上瘻瘡鹽湯洗貼酒下一丸婦人血脈不通甘草湯下
一切瘡癰并腫痛瘡及疥癩別煉油少許和膏塗之

玄參

白芷

當歸

赤芍藥

肉桂去粗

大黃

生地黄略

右剉碎用麻油二斤浸春五夏三秋七冬十日火熬黑色
瀝去滓入黃丹一斤青柳枝不住手攪候滴水中成珠不
粘手為度傾入磁器中以磚蓋口掘窖子埋陰樹下以土
覆三日出火毒欲服丸如鷄頭大

透骨金絲萬應膏

木鼈子

牛膝

研各一兩

自然銅

紫花地丁

白龍研

當歸

各半兩

川烏

二枚切破

葶麻子

二兩切碎

金剛骨

九錢

已上藥用小油一斤浸一宿慢火煎後入桃柳槐枝同熬
葉焦綿瀝去滓入黃丹六兩熬二沸次入

白膠香

半兩

乳香

研

雄黃

白丁香

密佗僧

沒藥

各一兩

右研細同熬勻再以綿瀝過看硬軟取之收貯用時隨瘡

大小紙上攤貼

青龍五生膏 治癰疽疔瘻惡瘡膿血出者

生桑白皮 生青竹茹 生栢白皮 生梧桐白皮

生龍膽草 各五兩 碎 蜂房 蝟皮

蛇蛻皮 雄黃 雌黃 各兩 附子

芎藭 蜀椒 各五

右次咀以三年苦酒二斗浸一宿於炭火上炙乾搗篩以

猪脂一升半微火煎攪令相得如飴著冷水中新白磁器

盛稍稍隨病深淺傳之并以清酒服棗核大日一服

白龍膏 治五發惡瘡及湯火燒凍破潰爛上痛生肌清血

狀消毒散腫通氣脉如神可無般痕

白薇 白欬 白芷 桑白皮

黃芪 商陸根 柳白皮 各一 乳香 二兩

輕粉

研半兩

定粉

研半斤

黃蠟

研半斤

杏子油

一斤如元蘇四代之

右藥剉油內搗浸三日於木炭火上煎白芷黃色瀝去滓於油內下黃蠟乳香候熔開出火再瀝候微冷下輕粉急撓至冷礮器收每用緋絹攤貼

膏藥方

治諸瘡腫毒

一丹二油巴三五

輕粉麝香加浸乳

琥珀珠砂石腦油

七味將來同少許

文武火上用心熬

若杖撓來如狼虎

不問諸瘡并腫毒

貼上如同神鬼取

膏藥方

桃柳冬青淡竹黃

枸杞松槐更及桑

當歸柴胡香白芷

二十四氣為正量

黃丹二兩油加倍

湯火之中要相當

乳香沒藥加此子

切莫輕信亂傳方

神異膏

治癰疽諸般惡毒瘡癤其効如神治疔疾先以

麥飯石膏塗付俟其瘡相附漸收止於徑寸大却用神異膏貼之收口此藥隨其入病深淺取効合時不可與婦人鷄犬猫厭穢物見之

玄參

半兩

綿黃耆

三分

杏仁

去皮尖

全蛇蛻

鹽水洗焙半兩

男子亂髮

洗淨焙乾半兩

露蜂房

半兩對一兩用有蜂兒者為妙

黃丹

飛羅細

真麻油

一斤

右將麻油同髮入銀鉚中文武火熬候髮焦熔盡以杏仁投入候變黑色用好綿瀝去滓再將所熬清油入鉚內然後入玄參黃芪慢火熬一二時取出鉚子安冷爐上半時久火力稍息旋入露蜂房蛇蛻二味將柳枝急攪却移鉚於火上不住手攪慢火熬至紫黃色用綿瀝過濾入清油

在鉢內乘冷放黃丹急攪片時又移鉢於火上以文武慢火熬不住手柳枝攪十餘轉候藥油變黑色滴於水中凝結成珠則是膏成就若珠子稀再熬少時必候其得所然後磁器內收封待用或恐偶然熬火太過稍硬難於用知少時蠟熬麻油在內以磁器盛封蓋於甑上蒸乘熱攪調收用膏藥熬成了須連所乘磁器置淨水中出火毒一晝夜歇三日方可用日換兩次夜換一次熬此膏藥極難於火候須奈煩者火緊慢火猛則藥中火癸不特失藥性又傷人面目救助不及千方謹戒膏藥方甚多不下數十治直之時神効無出於此方千金不換杖瘡尤妙

白玉膏

治縮收癰疽不令延蔓切忌用涼藥

杏仁

皮二十兩

川椒

炒四十九粒去月

清油

一兩

酒蠟

半兩

右用藥至紫黑新綿濾過用無灰薄紙看瘡大小剪作梳
樣攤藥在上於瘡暈盡處兩邊圍繞貼之候暈漸收近裏
即別剪差小者再攤藥圍貼暈又收即又再移近裏貼仍
頻換候暈已收見瘡根脚成瘡口即用次方凡貼大惡瘡
毒氣方盛不可以藥當上貼恐起散毒氣瘡益大此藥能
收暈見瘡其法大妙

水晶膏 治疔瘡背疽癰疽如癰丹毒杖瘡等疾

好白油單紙

十張每張作八片

黃連

一兩去

右用水兩碗砂鍋內以黃連煎至一椀半先下油單紙五
張又續下五張同煎五七百沸湯耗旋添不得犯鐵器瀝
起藥去黃連滓屑焙乾如瘡破有膿將藥花旋鬆貼如狀
瘡約度大小恰好剪貼不可太大先將周回剪下油紙燒
灰熱酒調膏生薑送下此貼藥不得犯女人手

十香膏 治風毒瘡腫癰疽疔贅癰癭

沉香

檀香

鬱金

松香

丁香

不香

龍齒

蘇合香

白膠香

薰陸香

麝香

黃丹

麻油

右先將沉香檀鬱金丁香五味油內浸七日入鍋中以少炭

火溫發五日后民武火煎二三十沸瀝去香綿濾過淨拭

鍋却下油於內下丹以柳木枝不住手於火上攪候色黑

沸水中如珠軟硬得所去火入后木香等末六味入膏中

攪三五百遍膏成安磁盒內以軟帛攤貼日二換之

止痛膏 治一切癰疽癰背潰后日夜疼痛排膿

當歸

鹿角膠

密陀僧

鹽花

硃砂

川芎

藥本

桂心

細辛

黃蠟

膩粉

乳香

研各三分

麝香

炒一分

黃丹

五兩

麻油

一斤

右將油安鍋內鍊沸下當歸等煎候白芷赤焦色綿漚去滓淨拭鍋仍下藥油依前慢火熬下蠟丹不住手以柳木枝撓候色黑次下罌他僧鹿角膠益花次下膩粉次下乳香次下麝香研砂等慢火熬撓候藥黑色即滴水內如軟硬得所藥成入銅罐中待凝於淨地上安一宿以物蓋之出火毒每用故帛上攤貼日再換

生肌膏

治一切癰疽發背潰后肌肉不生

亂髮

松脂

薰陸香

各半

故緋帛

燒灰一尺

故青帛

燒灰一尺

黃蠟

一兩

黃丹

六兩

右以油一斤先煎一兩沸內髮煎令消盡然後下蠟松脂量陸香青緋帛灰煎撓令泔以綿漚去滓却入鍋中下丹

以火煎撓令黑色軟硬得所貯磁器中少許塗於樹葉上貼日二易之

燒毒膏 治瘰癧漏瘡一切惡瘡

右用黃丹不拘多少以苦竹園中地龍泥裹包火煨令紅取出放冷去泥細研和以輕粉麻油調如膏藥攤在油紙上貼之李中父傳屢用効

太乙膏 治瘰癧子瘡神効

沒藥 四兩

麝香 三兩

乳香

輕粉 各二

片腦 一兩

黃丹 五兩

清油 一斤

右先將油丹熬以柳枝撓又用熬葱七根先熬一根令焦再下一根葱盡為度下火不住手撓看冷熱入腦等撓勻磁器盛用時旋攤貼

駢贅膏 治入癰疽一切惡瘡軟癰不問年月深淺已未成

膿者貼之即効及湯火傷皆可內服外貼神効

白芷

白欬

川芎

甘草

四兩上各

當歸 二兩

丁香

乾蟾 各半

木鼈

子 二十

沒藥

別研 一兩五

乳香

別研 二兩半

片腦

一兩

杏仁

九十

鼠頭

二個

麒麟竭

研 一兩

真緋絹

燒灰

黃丹

十兩

清麻油

二斤

室女油

頭髮

如拳

右剉細以好酒拌濕一宿入鐺內用油煎候藥深赤黑色
濾去滓別入淨鐺慢火煎少頃即入別研者及黃丹蠟以
柳枝不住手撓時時滴入水試看軟硬得所即是成膏發
背未膿者半入銀石器慢火熬及半盞許去滓次入乳香
碾碎先入又熬之候如一茶脚許先將蜜熬去滓放冷却
入前熬者膏子及衆末撓勻再熬候金漆狀乃成入不犯
水礪器內收之每用少許點大効

五枝膏 治一切惡瘡腫毒等疾

香油 一斤

黃丹 五兩

槐枝

梧桐枝

柳枝

桑枝

桃枝 各長一寸

右先將油同枝入鍋內文武火煎聚藥黑色濾去滓次下黃丹不住手攪候黑色收磁器內綯帛攤貼

司馬溫公解毒膏 治諸瘡久不收瘡宜貼之

杏仁 四十箇

筆麻子 四十箇

水龍子 箇去殼

槐枝 四兩

柳枝 二兩

桃枝 三兩

乳香 三分

黃丹 膏秋用三兩半夏

用四兩冬用三兩

麻油 半斤

右將油入鍋內下藥熬焦黃色綿濾去滓再熬滴水成珠不散為度下乳香太攪勻每用紙攤貼

神效回生膏

治癰疽癰毒遠近腫瘡打撲損傷腫毒發背力

斧所傷箭頭在內蛇犬所傷並皆治之

槐枝

桃枝

榆枝

桑枝

狗胆枝

已上各物者剉取皮者各

白

白芨

白朮

當歸

大芥

黃蘗

杏仁

赤芍藥

草麻子

去殼配半

血竭半兩

輕粉三錢

黃丹

十二

沒藥半兩

乳香半兩

椎黃半兩

右先將大枝皮用清油三升於砂鍋內文武火煎令滓液

盡為度濾過却將白芷等九味剉碎下油內浸透又用慢

火煎焦去滓再濾過却將黃丹分作三次下熬令黑色滴

水中不散為度却將血竭等末待油微溫下於油內磁罐

盛之蓋口埋土內三日出火毒任意攤貼

萬金膏

治癰疽發背諸般瘡癤從高墜墮打撲傷損脚膝生

瘡連年膿瘡五般痔漏一切惡瘡又云專治發背神妙不

可具言右初覺或做瘡用牛皮膠熬令稀稠得所如藥化攤在毛頭紙上於初覺處或有做瘡處貼次用軟布帕子二條於醋末醋內煮令熱漉出互相於膠紙上乘熱蒸熨不可令布帕冷布帕二條不可都齊漉出常留一條在醋內煮候蒸熨得一條冷却於醋內取熱布蒸冷布却入醋內煮候幾常得熱布替換熨蒸即易見効若瘡痒乃是藥攻其病須忍痒不止蒸熨直候膿出將盡即濃煎貫衆湯候溫洗去膠紙次日依前更洗若尚有膿又如前法蒸熨雖連數日蒸熨不妨但要瘡中膿盡瘡乾為度然後用生肌紅玉散搽在瘡上即以萬金膏貼每日一上或兩上每用再蒸熨並如前法鋪膠紙於瘡上熨了亦如前用貫衆湯洗去膠紙

龍骨

龜甲

苦參

烏賊魚骨

黃蘗

章烏

黃連

猪牙皂角

黃芩

白芨

白欬

木鼈子

當歸

白芷

川芎

厚朴去粗皮

槐枝

柳枝

俱剉碎各一分乳香一別研錢

沒藥別研一分

黃丹

半兩

清麻油

肉兩冬月半斤

右除乳收丹外餘藥入油內慢火煎候白芷焦色去滓入黃丹一半不住手攪令微黑色更入黃丹仍攪待滴入水中成珠不粘手為度攪溫下乳沒末亦攪勻磁器盛用將量瘡大小攤紙貼之治諸惡瘡加自然銅肉桂各一分一方無當歸

活絡內炙膏

治閃胸筋骨但是一切無名腫毒疼痛

當歸

黃芪

白芷

芍藥

半夏

木鼈子

銅青酪

白膠香半斤

乳香

沒藥各一

麻油二斤

右將前六味剉碎入油內熬至白芷焦色瀝去滓下白膠香直至黑色次下乳沒銅青末撈勻用時隨病大小厚紙攤貼患處

金絲萬應膏

治搥撲傷損手足有背并寒濕脚氣痰痺不可

忍小兒脾疳瀉痢咳嗽不肯服藥者

瀝青

半斤

威靈仙

二斤

草麻子

一百枚去皮

黃蠟

二斤

木鼈子

二十八枚去殼切片研

沒藥

乳香

各一斤

麻油

夏二斤春秋三斤冬四斤

右先將瀝青同威靈仙下鍋熬化以槐柳枝撈候焦黑色重綿瀝過以瀝青入水盆候冷成塊取出和斤三斤淨再下鍋鎔開下麻油黃蠟草麻木鼈子泥不住手槐柳枝撈勻須慢火滴入水中不粘手扯拔如金絲狀方可如硬再旋

加油少許如軟加瀝青試得如法却下乳沒末起鍋在灰
火上再用槐柳條撓數百次又以簍布瀝膏在水盆內杜
被如金絲頻換水浸二日却用小鉤盛頭如落馬墜車於
被傷疼痛處火上炙熱貼透骨肉為驗連換熱水數次烙
之則熱血聚膿自消小兒脾疳貼患處瀉痢貼肚上咳嗽
貼背心上

無比神應膏 治諸般惡毒瘡腫發背癰疽瘰癧瘡瘡脚氣打
撲傷損刀斧傷湯燒火燒馬犬蛇虫蜈蚣蜂蠍多年咳嗽
口內吐血貼背取毒愈心疼腹痛小腸疝氣赤白痢瀉不
止於臍下貼即痊牙疼貼腮上止肉潰流膿頑癬腰痛如
癰癰瘻杖瘡重者再貼即安

白芨

白欬

白芷

木鼈子仁

官桂

杏仁

當歸

桂花

乳香

沒藥各一

蘇合香二兩黃丹半斤

真麻油五斤槐柳枝各半

右剉碎除乳香沒藥黃丹蘇合香各另研外其餘藥於酒內浸至日期用文武火熬一順撓槐柳枝黑色去滓待溫下乳沒蘇合香各再熬不住手撓微滾三兩沸放溫一面撓一面下黃丹文武火熬滾起火再滾如此五七次不住手撓至數千次煙盡黑色為度滴水中不散方可切不可用火長日熬忌鷄犬婦人見

飛丹法

凡膏藥中鮮有不用號丹其貨賣者多用硝与鹽雜

和在內重秤若不飛過而用反有害方法于後

右用號丹即黃丹先以冷水漂過去其鹽硝水再用水漂再去其水澄乾微火炒紫色將紙攤地上出火毒用時再

研至無聲纔用

熬膏藥法 凡用乳香沒藥須用燈心同於乳鉢內研細不然難為研細候藥成膏提起藥鉢仍撓無烟起去燈心篩末入油內不住手撓勻

右熬藥用磁器或銅鐵鉢內盛油浸藥一宿慢火煎熬諸藥黑色用生絹帛濾去滓留下一兩重藥油復將所濾油於慢火上再熬却將芫丹入油內用長槐柳枝不住手撓候有微烟即提起藥鉢就柳條點藥油滴在水面上凝結成珠不散方成膏矣如油散珠不成再熬直待成膏提起藥鉢撓無烟出却入乳香沒藥撓勻傾出磁器內將原留下油洗鉢一件收拾器內用新汲水一日一換將藥器坐水內浸三日出火毒方可用如膏藥硬約量加芫蠟清油入膏內撓勻得所其芫蠟等油減半用

熬膏藥極難於火候須耐煩者火緊慢火猛則藥中火發
不特失藥性之燥傷製藥人面目